

令和5年版福島県農作物病害虫防除指針の変更

○令和5年10月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ	作物名	農薬名	変更があった箇所	変更前	変更後	変更月日
P35	水稻	モンガリット粒剤	使用時期(収穫前日数)	収穫45日前まで	収穫30日前まで	10月18日
P354			防除時期「 幼果期(6月25日～30日) 」 対象病害虫「 晩腐病 」 防除方法(薬剤の種類、濃度、使用量)	ミギワ20フロアブル 2,000倍	ミギワ20フロアブル <u>2,000倍</u>	
			防除時期「 幼果期(6月25日～30日) 」 備考	1 ベと病の発生が多い場合は、ミギワ20フロアブル2,000倍に～を参照する。	1 ベと病の発生が多い場合は、ミギワ20フロアブル <u>2,000倍</u> に～を参照する。	
P357	ブドウ	ミギワ20フロアブル	防除時期「 幼果期(6月25日頃) 」 対象病害虫「 晩腐病 」 防除方法(薬剤の種類、濃度、使用量)	ミギワ20フロアブル 2,000倍	ミギワ20フロアブル <u>2,000倍</u>	10月25日
			防除時期「 幼果期(6月25日頃) 」 備考	1 ベと病の発生が多い場合は、ミギワ20フロアブル2,000倍に～を参照する。	1 ベと病の発生が多い場合は、ミギワ20フロアブル <u>2,000倍</u> に～を参照する。	
P359			晩腐病 4薬剤による防除 薬剤系統「 A5 」	ミギワ20フロアブル 2,000倍	ミギワ20フロアブル <u>2,000倍</u>	
P409	リンゴ ブドウ	バスタ液剤	主な対象雑草「 一年生雑草 」 濃度・使用量(散布液量)	300～500ml/10a(100～150L/10a)	リンゴ、ブドウ 300～500ml/10a(通常散布100～150L/10a)(少量散布30～40L/10a) モモ、ナシ、カキ、オウトウ、スモモ、ウメ、ネクタリン 300～500ml/10a(100～150L/10a)	10月11日
			主な対象雑草「 多年生雑草 」 濃度・使用量(散布液量)	500～1,000ml/10a(100～150L/10a)	リンゴ、ブドウ 500～1,000ml/10a(通常散布100～150L/10a)(少量散布30～40L/10a) モモ、ナシ、カキ、オウトウ、スモモ、ウメ、ネクタリン 500～1,000ml/10a(100～150L/10a)	
P471	樹木類	バスタ液剤	濃度・使用量(散布液量)	300～500ml(水100～150L)/10a	300～500ml(通常散布水100～150L、少量散布水30～40L)/10a	

○令和5年10月に失効した農薬

失効月日	農薬名	備考	備考欄
10月10日	フェスティバルM 水和剤	ダイズP63、67	

注)最新の農薬登録情報を確認のうえ、農薬を使用すること。
注)メーカーにより使用基準が異なる場合があるため、ラベルに記載されている使用方法等を確認すること。