

令和6年度「県民健康調査」健康診査 健診項目別集計結果

【対象者】

- ・平成23年3月11日から平成24年4月1日までに対象地域※に住民登録をしていた方
(対象地域を転出後も対象とする)
- ・実施年度の4月1日時点で対象地域に住民登録をしていた方
- ・上記以外で基本調査の結果、必要と認められた方

※対象地域：平成23年時に避難区域等に指定された市町村等

広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村、南相馬市、田村市、川俣町、伊達市の一部（特定避難勧奨地点の属する区域）

【健診項目】

年齢区分	健診項目
0歳～6歳 (就学前乳幼児)	身長、体重、 [希望がある場合のみ] 血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画)
7歳～15歳 (小学校1年生～中学校3年生)	身長、体重、血圧、 血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画) [希望がある場合のみ] 血液生化学(AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 血清クレアチニン、尿酸)
16歳以上	身長、体重、腹囲(又はBMI)、血圧、 <u>血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画)</u> 尿検査(尿蛋白、尿糖、 <u>尿潜血</u>) 血液生化学(AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 <u>血清クレアチニン、eGFR、尿酸</u>) ※下線部は、通常、特定健康診査では検査しない追加項目

※一般的年齢区分と「健康診査」の健診項目の違いにより0～6歳、7～15歳、16～39歳、40～64歳、65歳以上の5つの年齢に区分し、健診項目毎に結果を集計した。

※健診項目毎に年齢群別及び性別に集計した。

※集計結果には、同一年度に2回以上受診をした方（重複受診者）については、受診日が早い方の健診結果1回分のみを含めている。

※集計結果の表章記号の規約は、厚生労働省の人口動態調査と同様に表記した。

計数のない場合	—
集計項目のない場合（年齢区分によって健診項目がない場合）	・
計数を表章することが不適当な場合	…
比率が微小（0.05未満）の場合	0.0%

※集計結果は、これまでの結果と比較することができるよう、従来と同様の項目を掲載しているため、令和6年度「県民健康調査」健康診査 結果報告に記載しているグラフの基準と一致しない場合がある。

※集計対象者数は、集計に利用したデータ数であるため、受診者数とは異なる。

身長

身長（cm）（全体）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	259	3.4	94.5
7～15	819	11.9	147.7
16～39	2,660	29.3	163.2
40～64	7,544	54.4	161.7
65～	18,633	74.4	156.8

身長（cm）（男性）					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150cm以下	170cm以上
0～6	132	3.5	95.3	…	…
7～15	408	11.7	148.3	…	…
16～39	1,063	28.0	170.8	0.6%	55.4%
40～64	2,757	54.4	169.9	0.3%	50.8%
65～	8,635	74.7	163.7	1.8%	16.1%

身長（cm）（女性）					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	140cm以下	160cm以上
0～6	127	3.3	93.8	…	…
7～15	411	12.0	147.1	…	…
16～39	1,597	30.1	158.1	0.2%	38.3%
40～64	4,787	54.4	157.0	0.2%	29.4%
65～	9,998	74.2	150.8	4.5%	5.9%

体重

体重（kg）（全体）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	259	3.4	14.6
7～15	819	11.9	42.2
16～39	2,660	29.3	62.0
40～64	7,544	54.4	63.1
65～	18,633	74.4	58.6

体重（kg）（男性）					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	50kg以下	70kg以上
0～6	132	3.5	15.0	…	…
7～15	408	11.7	42.3	…	…
16～39	1,063	28.0	70.2	6.0%	44.2%
40～64	2,757	54.4	72.4	1.3%	53.6%
65～	8,635	74.7	64.8	5.2%	27.7%

体重（kg）（女性）					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	45kg以下	65kg以上
0～6	127	3.3	14.2	…	…
7～15	411	12.0	42.2	…	…
16～39	1,597	30.1	56.6	13.3%	19.2%
40～64	4,787	54.4	57.7	10.0%	22.2%
65～	9,998	74.2	53.3	17.1%	10.3%

1.身体検査 (1)BMI

BMI (体重/身長 ²) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	18kg/m ² 未満	25kg/m ² 以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	.	.	.	.	.
16～39	2,660	29.3	23.2	8.7%	27.8%
40～64	7,544	54.4	24.0	4.7%	35.9%
65～	18,633	74.4	23.8	3.6%	33.7%

BMI (体重/身長 ²) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	18kg/m ² 未満	25kg/m ² 以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	.	.	.	.	.
16～39	1,063	28.0	24.0	6.4%	35.4%
40～64	2,757	54.4	25.0	1.5%	45.5%
65～	8,635	74.7	24.1	2.0%	37.0%

BMI (体重/身長 ²) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	18kg/m ² 未満	25kg/m ² 以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	.	.	.	.	.
16～39	1,597	30.1	22.6	10.3%	22.7%
40～64	4,787	54.4	23.4	6.6%	30.4%
65～	9,998	74.2	23.4	5.0%	30.8%

1.身体検査 (2)腹囲

腹囲 (cm) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	.	.	.
7～15	.	.	.
16～39	727	29.2	79.2
40～64	7,545	54.4	84.0
65～	11,173	70.5	85.0

腹囲 (cm) (男性)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	85cm以上
0～6	.	.	.	.
7～15	.	.	.	.
16～39	349	29.2	83.3	39.8%
40～64	2,758	54.4	87.7	58.0%
65～	4,988	70.7	86.8	56.6%

腹囲 (cm) (女性)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	90cm以上
0～6	.	.	.	.
7～15	.	.	.	.
16～39	378	29.2	75.5	9.5%
40～64	4,787	54.4	81.9	21.7%
65～	6,185	70.4	83.6	23.8%

1.身体検査（3）血圧

収縮期血圧（mmHg）（全体）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	140mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	818	11.9	106.2	0.1%
16～39	2,660	29.3	114.9	4.5%
40～64	7,547	54.4	125.0	17.0%
65～	18,636	74.4	131.6	29.4%

収縮期血圧（mmHg）（男性）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	140mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	407	11.7	106.9	0.2%
16～39	1,063	28.0	119.6	6.9%
40～64	2,758	54.4	127.3	19.1%
65～	8,635	74.7	131.2	28.4%

収縮期血圧（mmHg）（女性）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	140mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	411	12.0	105.5	－
16～39	1,597	30.1	111.8	2.9%
40～64	4,789	54.4	123.6	15.7%
65～	10,001	74.2	132.0	30.3%

拡張期血圧（mmHg）（全体）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	90mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	818	11.9	61.4	0.7%
16～39	2,660	29.3	69.7	3.8%
40～64	7,547	54.4	77.6	14.6%
65～	18,636	74.4	75.7	9.3%

拡張期血圧（mmHg）（男性）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	90mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	407	11.7	61.0	1.2%
16～39	1,063	28.0	71.8	5.5%
40～64	2,758	54.4	81.4	21.4%
65～	8,635	74.7	77.1	11.6%

拡張期血圧（mmHg）（女性）				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	90mmHg以上
0～6	・	・	・	・
7～15	411	12.0	61.8	0.2%
16～39	1,597	30.1	68.3	2.6%
40～64	4,789	54.4	75.5	10.7%
65～	10,001	74.2	74.6	7.2%

2.尿検査 (1)尿糖

尿糖（全体）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	2,640	29.3	1.5%
40～64	7,534	54.4	5.6%
65～	18,558	74.4	9.5%

尿糖（男性）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	1,062	28.1	2.1%
40～64	2,756	54.4	9.2%
65～	8,604	74.7	13.9%

尿糖（女性）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	1,578	30.1	1.1%
40～64	4,778	54.4	3.5%
65～	9,954	74.1	5.7%

2.尿検査 (2)尿蛋白

尿蛋白（全体）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	2,640	29.3	2.7%
40～64	7,534	54.4	1.9%
65～	18,558	74.4	3.6%

尿蛋白（男性）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	1,062	28.1	3.0%
40～64	2,756	54.4	2.9%
65～	8,604	74.7	5.4%

尿蛋白（女性）			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	1,578	30.1	2.5%
40～64	4,778	54.4	1.3%
65～	9,954	74.1	2.0%

2.尿検査 (3)尿潜血

尿潜血 (全体)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上	(1+)以上で生理中を除く
0～6	・	・	・	・
7～15	・	・	・	・
16～39	2,639	29.3	6.7%	2.6%
40～64	7,534	54.4	5.3%	3.8%
65～	18,558	74.4	4.8%	4.8%

尿潜血 (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上
0～6	・	・	・
7～15	・	・	・
16～39	1,062	28.1	0.7%
40～64	2,756	54.4	1.9%
65～	8,604	74.7	3.5%

尿潜血 (女性)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	(1+)以上	(1+)以上で生理中を除く
0～6	・	・	・	・
7～15	・	・	・	・
16～39	1,577	30.1	10.7%	3.9%
40～64	4,778	54.4	7.3%	5.0%
65～	9,954	74.1	5.9%	5.9%

3.末梢血液検査 (1)-1 赤血球

赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	4.66
7～15	803	11.9	4.77
16～39	2,658	29.3	4.75
40～64	7,542	54.4	4.61
65～	18,632	74.4	4.43

赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$3.69 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下	$3.99 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下	$5.80 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以上
0～6	123	3.6	4.68	－	－	－
7～15	401	11.7	4.91	0.2%	1.0%	0.7%
16～39	1,062	28.0	5.16	0.1%	0.3%	5.3%
40～64	2,756	54.4	4.89	1.0%	2.9%	2.4%
65～	8,633	74.7	4.59	4.2%	11.1%	0.7%

赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$3.39 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下	$3.69 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下	$5.50 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以上
0～6	109	3.4	4.64	－	－	0.9%
7～15	402	12.1	4.64	－	－	0.2%
16～39	1,596	30.1	4.47	0.2%	1.1%	0.6%
40～64	4,786	54.4	4.45	0.4%	1.8%	0.7%
65～	9,999	74.2	4.30	1.4%	6.3%	0.4%

3.末梢血液検査 (1)-2 ヘモグロビン

ヘモグロビン (g/dL) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	12.5
7～15	803	11.9	13.4
16～39	2,658	29.3	14.1
40～64	7,542	54.4	14.0
65～	18,632	74.4	13.7

ヘモグロビン (g/dL) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	12.0g/dL以下	13.0g/dL以下	18.0g/dL以上
0～6	123	3.6	12.5	31.7%	77.2%	－
7～15	401	11.7	13.8	4.2%	23.9%	－
16～39	1,062	28.0	15.5	0.6%	1.4%	0.8%
40～64	2,756	54.4	15.1	1.0%	4.4%	1.2%
65～	8,633	74.7	14.4	6.0%	16.5%	0.5%

ヘモグロビン (g/dL) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	11.0g/dL以下	12.0g/dL以下	16.0g/dL以上
0～6	109	3.4	12.5	4.6%	31.2%	－
7～15	402	12.1	13.1	2.2%	9.7%	－
16～39	1,596	30.1	13.1	4.3%	14.1%	0.3%
40～64	4,786	54.4	13.3	4.6%	12.2%	0.7%
65～	9,999	74.2	13.1	3.3%	15.1%	0.6%

3.末梢血液検査 (1)-3 ヘマトクリット

ヘマトクリット (%) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	38.0
7～15	803	11.9	41.1
16～39	2,658	29.3	42.7
40～64	7,542	54.4	42.3
65～	18,632	74.4	41.6

ヘマトクリット (%) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	35.9%以下	37.9%以下	55.0%以上
0～6	123	3.6	38.0	26.8%	50.4%	－
7～15	401	11.7	41.9	2.2%	12.0%	－
16～39	1,062	28.0	46.4	0.2%	0.7%	0.3%
40～64	2,756	54.4	45.3	0.9%	2.4%	0.5%
65～	8,633	74.7	43.3	4.5%	9.7%	0.2%

ヘマトクリット (%) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	28.9%以下	32.9%以下	48.0%以上
0～6	109	3.4	38.0	－	1.8%	－
7～15	402	12.1	40.4	0.2%	0.7%	－
16～39	1,596	30.1	40.2	0.4%	1.6%	0.3%
40～64	4,786	54.4	40.6	0.4%	2.1%	1.0%
65～	9,999	74.2	40.1	0.2%	1.7%	0.9%

3.末梢血液検査 (2)血小板数

血小板数 ($10^3/\mu\text{L}$) (全体)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$89 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$129 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$370 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$450 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	232	3.5	362.3	—	—	39.2%	13.4%
7～15	803	11.9	294.9	0.1%	0.2%	11.6%	2.1%
16～39	2,656	29.3	272.2	—	0.2%	6.6%	0.9%
40～64	7,533	54.4	261.5	0.1%	0.6%	4.9%	0.8%
65～	18,600	74.4	227.9	0.3%	2.0%	1.5%	0.3%

血小板数 ($10^3/\mu\text{L}$) (男性)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$89 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$129 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$370 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$450 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	123	3.6	356.2	—	—	35.8%	12.2%
7～15	401	11.7	296.6	—	—	12.0%	2.7%
16～39	1,061	28.0	263.2	—	—	3.9%	0.3%
40～64	2,751	54.4	254.4	0.1%	0.5%	2.8%	0.3%
65～	8,618	74.7	220.2	0.4%	2.6%	1.4%	0.3%

血小板数 ($10^3/\mu\text{L}$) (女性)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$89 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$129 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$370 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$450 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	109	3.4	369.3	—	—	43.1%	14.7%
7～15	402	12.1	293.2	0.2%	0.5%	11.2%	1.5%
16～39	1,595	30.1	278.2	—	0.3%	8.5%	1.3%
40～64	4,782	54.4	265.5	0.1%	0.6%	6.1%	1.1%
65～	9,982	74.2	234.6	0.3%	1.6%	1.7%	0.3%

3.末梢血液検査 (3)-1 白血球数

白血球数 ($10^3/\mu\text{L}$) (全体)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$2.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$3.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$9.6 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$11.1 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	232	3.5	9.0	—	0.4%	35.3%	17.7%
7～15	803	11.9	6.5	0.1%	2.6%	4.1%	1.7%
16～39	2,658	29.3	5.9	0.8%	8.1%	3.5%	1.3%
40～64	7,542	54.4	5.7	1.0%	11.0%	2.0%	0.6%
65～	18,632	74.4	5.7	0.7%	8.8%	1.9%	0.6%

白血球数 ($10^3/\mu\text{L}$) (男性)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$2.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$3.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$9.6 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$11.1 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	123	3.6	8.9	—	—	35.0%	18.7%
7～15	401	11.7	6.4	—	3.2%	3.5%	1.7%
16～39	1,062	28.0	5.9	0.5%	7.1%	3.3%	1.0%
40～64	2,756	54.4	6.0	0.4%	6.4%	2.5%	0.8%
65～	8,633	74.7	5.9	0.5%	6.7%	2.4%	0.8%

白血球数 ($10^3/\mu\text{L}$) (女性)							
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	$2.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$3.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以下	$9.6 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上	$11.1 \times 10^3/\mu\text{L}$ 以上
0～6	109	3.4	9.2	—	0.9%	35.8%	16.5%
7～15	402	12.1	6.6	0.2%	2.0%	4.7%	1.7%
16～39	1,596	30.1	5.9	1.0%	8.7%	3.6%	1.4%
40～64	4,786	54.4	5.5	1.4%	13.6%	1.7%	0.5%
65～	9,999	74.2	5.6	0.9%	10.7%	1.4%	0.4%

3.末梢血液検査 (3)-2 白血球分画(好中球)

好中球数 (個/ μ L) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	3,653
7～15	803	11.9	3,291
16～39	2,654	29.3	3,446
40～64	7,540	54.4	3,244
65～	18,632	74.4	3,280

好中球数 (個/ μ L) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	123	3.6	3,613
7～15	401	11.7	3,125
16～39	1,061	28.0	3,347
40～64	2,755	54.4	3,440
65～	8,633	74.7	3,422

好中球数 (個/ μ L) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	109	3.4	3,699
7～15	402	12.1	3,457
16～39	1,593	30.1	3,513
40～64	4,785	54.4	3,130
65～	9,999	74.2	3,158

3.末梢血液検査 (3)-3 白血球分画(リンパ球)

リンパ球数 (個/ μ L) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	4,538
7～15	803	11.9	2,504
16～39	2,654	29.3	1,952
40～64	7,540	54.4	1,912
65～	18,632	74.4	1,911

リンパ球数 (個/ μ L) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	123	3.6	4,423
7～15	401	11.7	2,495
16～39	1,061	28.0	2,001
40～64	2,755	54.4	1,966
65～	8,633	74.7	1,898

リンパ球数 (個/ μ L) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	109	3.4	4,668
7～15	402	12.1	2,513
16～39	1,593	30.1	1,920
40～64	4,785	54.4	1,881
65～	9,999	74.2	1,922

3.末梢血液検査 (3)-4 白血球分画(単球)

単球数 (個/ μ L) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	497
7～15	803	11.9	412
16～39	2,654	29.3	330
40～64	7,540	54.4	323
65～	18,632	74.4	341

単球数 (個/ μ L) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	123	3.6	500
7～15	401	11.7	418
16～39	1,061	28.0	347
40～64	2,755	54.4	365
65～	8,633	74.7	375

単球数 (個/ μ L) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	109	3.4	493
7～15	402	12.1	406
16～39	1,593	30.1	318
40～64	4,785	54.4	298
65～	9,999	74.2	312

3.末梢血液検査 (3)-5 白血球分画(好酸球)

好酸球数 (個/ μ L) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	292
7～15	803	11.9	260
16～39	2,654	29.3	167
40～64	7,540	54.4	164
65～	18,632	74.4	159

好酸球数 (個/ μ L) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	123	3.6	318
7～15	401	11.7	291
16～39	1,061	28.0	189
40～64	2,755	54.4	186
65～	8,633	74.7	184

好酸球数 (個/ μ L) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	109	3.4	264
7～15	402	12.1	230
16～39	1,593	30.1	153
40～64	4,785	54.4	151
65～	9,999	74.2	138

3.末梢血液検査 (3)-6 白血球分画(好塩基球)

好塩基球数 (個/ μ L) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	232	3.5	43
7～15	803	11.9	42
16～39	2,654	29.3	41
40～64	7,540	54.4	42
65～	18,632	74.4	39

好塩基球数 (個/ μ L) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	123	3.6	41
7～15	401	11.7	43
16～39	1,061	28.0	43
40～64	2,755	54.4	46
65～	8,633	74.7	41

好塩基球数 (個/ μ L) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	109	3.4	46
7～15	402	12.1	41
16～39	1,593	30.1	40
40～64	4,785	54.4	40
65～	9,999	74.2	38

4.血液生化学 (1)-1 肝機能(AST)

AST (U/L) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	22.7	10.6%	0.9%
16～39	2,659	29.3	22.0	11.2%	2.6%
40～64	7,544	54.4	24.2	14.7%	2.9%
65～	18,634	74.4	25.2	15.4%	2.4%

AST (U/L) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	25.1	17.0%	1.5%
16～39	1,062	28.0	25.9	20.6%	4.3%
40～64	2,757	54.4	26.9	22.3%	4.9%
65～	8,634	74.7	26.1	18.7%	2.9%

AST (U/L) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	20.3	4.3%	0.3%
16～39	1,597	30.1	19.4	4.9%	1.4%
40～64	4,787	54.4	22.7	10.3%	1.7%
65～	10,000	74.2	24.5	12.5%	2.0%

4.血液生化学 (1)-2 肝機能(ALT)

ALT (U/L) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	16.1	5.8%	2.4%
16～39	2,659	29.3	24.4	19.9%	9.4%
40～64	7,544	54.4	24.9	21.6%	7.0%
65～	18,634	74.4	21.7	13.8%	3.3%

ALT (U/L) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	18.9	9.2%	3.7%
16～39	1,062	28.0	34.8	37.3%	18.5%
40～64	2,757	54.4	31.5	35.1%	12.6%
65～	8,634	74.7	23.6	18.3%	4.3%

ALT (U/L) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	31 U/L以上	51 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	13.2	2.3%	1.0%
16～39	1,597	30.1	17.4	8.3%	3.3%
40～64	4,787	54.4	21.2	13.8%	3.7%
65～	10,000	74.2	20.1	9.9%	2.4%

4.血液生化学 (1)-3 肝機能(γ -GT)

γ -GT (U/L) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	51 U/L以上	101 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	14.8	0.8%	-
16～39	2,659	29.3	26.8	10.2%	2.4%
40～64	7,544	54.4	39.0	19.3%	6.0%
65～	18,634	74.4	33.9	13.5%	3.7%

γ -GT (U/L) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	51 U/L以上	101 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	16.6	1.5%	-
16～39	1,062	28.0	37.4	19.2%	5.0%
40～64	2,757	54.4	56.7	34.0%	12.2%
65～	8,634	74.7	43.0	20.6%	6.1%

γ -GT (U/L) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	51 U/L以上	101 U/L以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	12.9	-	-
16～39	1,597	30.1	19.7	4.1%	0.7%
40～64	4,787	54.4	28.8	10.8%	2.5%
65～	10,000	74.2	26.1	7.4%	1.7%

4.血液生化学 (2)-1 脂質(LDLコレステロール)

LDL-C (mg/dL) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	120 mg/dL以上	140 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	90.0	9.0%	2.5%
16～39	2,659	29.3	111.2	36.0%	16.9%
40～64	7,544	54.4	123.2	52.6%	28.8%
65～	18,634	74.4	114.2	40.7%	18.7%

LDL-C (mg/dL) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	120 mg/dL以上	140 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	89.0	9.2%	2.7%
16～39	1,062	28.0	115.3	42.8%	21.8%
40～64	2,757	54.4	121.1	50.9%	26.7%
65～	8,634	74.7	109.7	35.4%	15.0%

LDL-C (mg/dL) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	120 mg/dL以上	140 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	90.9	8.8%	2.3%
16～39	1,597	30.1	108.5	31.4%	13.7%
40～64	4,787	54.4	124.4	53.6%	30.0%
65～	10,000	74.2	118.1	45.3%	21.9%

4.血液生化学 (2)-2 脂質(随時中性脂肪)

中性脂肪 (TG) (mg/dL) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	83.2	8.3%	0.9%
16～39	2,659	29.3	91.3	12.4%	1.6%
40～64	7,544	54.4	113.9	19.3%	3.1%
65～	18,634	74.4	111.3	18.4%	1.6%

中性脂肪 (TG) (mg/dL) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	77.6	7.5%	0.5%
16～39	1,062	28.0	110.3	19.6%	3.0%
40～64	2,757	54.4	142.0	29.7%	6.3%
65～	8,634	74.7	116.8	21.1%	2.3%

中性脂肪 (TG) (mg/dL) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	88.8	9.0%	1.3%
16～39	1,597	30.1	78.6	7.6%	0.6%
40～64	4,787	54.4	97.7	13.3%	1.3%
65～	10,000	74.2	106.6	16.0%	1.0%

4.血液生化学 (2)-2 脂質(空腹時中性脂肪のみ)

空腹時中性脂肪 (TG) (mg/dL) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	486	12.2	75.2	6.0%	0.4%
16～39	2,435	29.3	90.7	12.0%	1.6%
40～64	6,752	54.3	111.2	18.0%	2.7%
65～	14,916	74.1	107.1	16.1%	1.2%

空腹時中性脂肪 (TG) (mg/dL) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	247	11.9	68.2	4.9%	—
16～39	970	28.1	110.1	19.2%	3.0%
40～64	2,435	54.3	139.0	28.5%	5.8%
65～	6,926	74.3	112.4	19.1%	1.7%

空腹時中性脂肪 (TG) (mg/dL) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	150 mg/dL以上	300 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	239	12.5	82.4	7.1%	0.8%
16～39	1,465	30.1	77.8	7.2%	0.7%
40～64	4,317	54.3	95.5	12.1%	1.0%
65～	7,990	73.8	102.4	13.4%	0.8%

4.血液生化学 (2)-3 脂質(HDLコレステロール)

HDL-C (mg/dL) (全体)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	40 mg/dL未満
0～6	.	.	.	.
7～15	800	11.9	59.9	2.8%
16～39	2,659	29.3	62.2	4.1%
40～64	7,544	54.4	65.6	3.8%
65～	18,634	74.4	61.5	4.9%

HDL-C (mg/dL) (男性)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	40 mg/dL未満
0～6	.	.	.	.
7～15	401	11.7	60.5	4.0%
16～39	1,062	28.0	56.0	7.4%
40～64	2,757	54.4	58.2	8.2%
65～	8,634	74.7	56.9	8.2%

HDL-C (mg/dL) (女性)				
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	40 mg/dL未満
0～6	.	.	.	.
7～15	399	12.1	59.4	1.5%
16～39	1,597	30.1	66.3	1.9%
40～64	4,787	54.4	69.8	1.3%
65～	10,000	74.2	65.4	2.0%

4.血液生化学 (3)-1 糖(空腹時血糖)

空腹時血糖値 (mg/dL) (全体)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	110 mg/dL以上	130 mg/dL以上	160 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	486	12.2	87.4	0.2%	—	—
16～39	2,435	29.3	89.1	2.8%	1.3%	0.7%
40～64	6,752	54.3	97.2	12.6%	4.4%	1.4%
65～	14,916	74.1	103.4	24.6%	8.3%	2.0%

空腹時血糖値 (mg/dL) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	110 mg/dL以上	130 mg/dL以上	160 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	247	11.9	87.9	0.4%	—	—
16～39	970	28.1	90.9	3.9%	1.8%	0.9%
40～64	2,435	54.3	101.8	18.9%	7.0%	2.4%
65～	6,926	74.3	106.5	31.0%	11.5%	2.7%

空腹時血糖値 (mg/dL) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	110 mg/dL以上	130 mg/dL以上	160 mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	239	12.5	86.9	—	—	—
16～39	1,465	30.1	88.0	2.0%	1.0%	0.5%
40～64	4,317	54.3	94.6	9.0%	2.9%	0.9%
65～	7,990	73.8	100.6	19.1%	5.5%	1.4%

4.血液生化学 (3)-2 糖(HbA1c)

HbA1c (%) (NGSP) (全体)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	6.0%以上	7.0%以上	8.0%以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	5.4	0.3%	—	—
16～39	2,659	29.3	5.3	2.4%	1.2%	0.7%
40～64	7,544	54.4	5.6	13.5%	3.3%	1.1%
65～	18,633	74.4	5.8	26.0%	4.6%	0.9%

HbA1c (%) (NGSP) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	6.0%以上	7.0%以上	8.0%以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	5.4	0.5%	—	—
16～39	1,062	28.0	5.3	3.1%	1.7%	1.0%
40～64	2,757	54.4	5.6	17.8%	5.1%	1.8%
65～	8,634	74.7	5.8	30.3%	6.2%	1.1%

HbA1c (%) (NGSP) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	6.0%以上	7.0%以上	8.0%以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	5.4	—	—	—
16～39	1,597	30.1	5.2	1.9%	0.8%	0.5%
40～64	4,787	54.4	5.5	11.0%	2.2%	0.8%
65～	9,999	74.2	5.7	22.2%	3.3%	0.7%

4.血液生化学 (4)-1 腎機能(血清クレアチニン)

血清クレアチニン (mg/dL) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	.	.	.
7～15	800	11.9	0.53
16～39	2,659	29.3	0.71
40～64	7,544	54.4	0.75
65～	18,634	74.4	0.82

血清クレアチニン (mg/dL) (男性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	1.15mg/dL以上	1.35mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	0.56	—	—
16～39	1,062	28.0	0.85	1.2%	0.2%
40～64	2,757	54.4	0.88	3.7%	0.8%
65～	8,634	74.7	0.95	12.3%	4.6%

血清クレアチニン (mg/dL) (女性)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	0.95mg/dL以上	1.15mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	0.51	—	—
16～39	1,597	30.1	0.63	0.6%	0.1%
40～64	4,787	54.4	0.67	1.2%	0.3%
65～	10,000	74.2	0.71	5.5%	1.7%

4.血液生化学 (4)-2 腎機能(eGFR)

eGFR (mL/min/1.73m ²) (全体)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	.	.	.
7～15	.	.	.
16～39	2,659	29.3	92.6
40～64	7,544	54.4	73.7
65～	18,634	74.4	63.7

eGFR (mL/min/1.73m ²) (男性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	.	.	.
7～15	.	.	.
16～39	1,062	28.0	92.0
40～64	2,757	54.4	73.9
65～	8,634	74.7	63.6

eGFR (mL/min/1.73m ²) (女性)			
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値
0～6	.	.	.
7～15	.	.	.
16～39	1,597	30.1	93.0
40～64	4,787	54.4	73.6
65～	10,000	74.2	63.8

4.血液生化学 (4)-3 腎機能(尿酸)

尿酸 (mg/dL) (全体)					
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	7.1mg/dL以上	8.0mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.
7～15	800	11.9	4.8	4.0%	0.9%
16～39	2,659	29.3	5.2	10.8%	4.1%
40～64	7,544	54.4	5.2	8.9%	2.4%
65～	18,634	74.4	5.2	8.1%	2.3%

尿酸 (mg/dL) (男性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	7.1mg/dL以上	7.9mg/dL以上	8.0mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	401	11.7	5.2	7.7%	2.2%	1.7%
16～39	1,062	28.0	6.2	24.3%	10.2%	9.4%
40～64	2,757	54.4	6.0	20.5%	6.8%	5.8%
65～	8,634	74.7	5.7	13.9%	4.7%	3.9%

尿酸 (mg/dL) (女性)						
年齢区分	集計対象者数(人)	平均年齢	平均値	5.6mg/dL以上	7.1mg/dL以上	8.0mg/dL以上
0～6	.	.	.	.	.	.
7～15	399	12.1	4.4	8.5%	0.3%	—
16～39	1,597	30.1	4.4	12.5%	1.9%	0.6%
40～64	4,787	54.4	4.7	19.1%	2.3%	0.5%
65～	10,000	74.2	4.8	22.6%	3.1%	0.9%