

令和元年度 県民健康調査「健康診査」 健診項目別集計結果

【対象者】

- ・平成23年3月11日から平成24年4月1日までに対象地域※に住民登録をしていた方
(対象地域を転出後も対象とする)
- ・実施年度の4月1日時点で避難区域等に住民登録をしていた方
- ・上記以外で基本調査の結果、必要と認められた方

※対象地域：平成23年時に避難区域等に指定された市町村等

広野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、南相馬市、田村市、川俣町、伊達市の一部（特定避難勧奨地点の属する区域）

【健診項目】

| 年齢区分 | 健診項目 |
|---------------------------|---|
| 0歳～6歳 (就学前乳幼児) | 身長、体重、 [希望がある場合のみ] 血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画) |
| 7歳～15歳 (小学校1年生～中学校3年生) | 身長、体重、血圧、 血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画) [希望による追加項目] 血液生化学(AST、ALT、 γ -GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 血清クレアチニン、尿酸) |
| 16歳以上 | 身長、体重、腹囲(又はBMI)、血圧、 <u>血算(赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画)</u> 尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血) 血液生化学(AST、ALT、 γ -GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 <u>血清クレアチニン、eGFR、尿酸</u>) ※下線部は、通常、特定健康診査では検査しない追加項目 |

※一般的年齢区分と「健康診査」の健診項目の違いにより0～6歳、7～15歳、16～39歳、40～64歳、65歳以上の5つの年齢に区分し、健診項目毎に結果を集計した。

※健診項目毎に年齢群別及び性別に集計した。

※集計結果には、同一年度に2回以上受診をした者（重複受診者）が含まれている。

※集計結果の表章記号の規約は、厚生労働省の人口動態調査と同様に表記した。

- | | |
|------------------------------|------|
| 計数のない場合 | — |
| 集計項目のない場合（年齢区分によって健診項目がない場合） | ・ |
| 計数を表章することが不適当な場合 | … |
| 比率が微小（0.05未満）の場合 | 0.0% |

身長

| 身長 (cm) (全体) | | | |
|--------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0～6 | 959 | 3.4 | 93.8 |
| 7～15 | 2,457 | 11.2 | 143.6 |
| 16～39 | 2,984 | 29.4 | 163.0 |
| 40～64 | 10,095 | 55.1 | 160.7 |
| 65～ | 19,525 | 73.4 | 155.8 |

| 身長 (cm) (男性) | | | | | |
|--------------|---------|------|-------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150cm以下 | 170cm以上 |
| 0～6 | 488 | 3.4 | 94.1 | … | … |
| 7～15 | 1,232 | 11.2 | 144.6 | … | … |
| 16～39 | 1,174 | 28.1 | 170.7 | 0.6% | 54.9% |
| 40～64 | 3,608 | 55.4 | 168.8 | 0.1% | 42.8% |
| 65～ | 8,977 | 73.5 | 162.7 | 2.3% | 12.2% |

| 身長 (cm) (女性) | | | | | |
|--------------|---------|------|-------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140cm以下 | 160cm以上 |
| 0～6 | 471 | 3.5 | 93.4 | … | … |
| 7～15 | 1,225 | 11.3 | 142.5 | … | … |
| 16～39 | 1,810 | 30.2 | 158.0 | 0.3% | 36.7% |
| 40～64 | 6,487 | 54.9 | 156.1 | 0.4% | 24.4% |
| 65～ | 10,548 | 73.2 | 149.9 | 5.4% | 3.9% |

体重

| 体重 (kg) (全体) | | | |
|--------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0～6 | 959 | 3.4 | 14.4 |
| 7～15 | 2,457 | 11.2 | 38.7 |
| 16～39 | 2,984 | 29.4 | 60.9 |
| 40～64 | 10,095 | 55.1 | 62.1 |
| 65～ | 19,526 | 73.4 | 58.3 |

| 体重 (kg) (男性) | | | | | |
|--------------|---------|------|------|--------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 50kg以下 | 70kg以上 |
| 0～6 | 488 | 3.4 | 14.6 | … | … |
| 7～15 | 1,232 | 11.2 | 39.7 | … | … |
| 16～39 | 1,174 | 28.1 | 69.3 | 6.0% | 41.7% |
| 40～64 | 3,608 | 55.4 | 70.7 | 2.2% | 48.3% |
| 65～ | 8,977 | 73.5 | 64.3 | 6.1% | 25.5% |

| 体重 (kg) (女性) | | | | | |
|--------------|---------|------|------|--------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 45kg以下 | 65kg以上 |
| 0～6 | 471 | 3.5 | 14.2 | … | … |
| 7～15 | 1,225 | 11.3 | 37.7 | … | … |
| 16～39 | 1,810 | 30.2 | 55.5 | 12.9% | 16.3% |
| 40～64 | 6,487 | 54.9 | 57.3 | 8.6% | 20.1% |
| 65～ | 10,549 | 73.2 | 53.2 | 16.7% | 9.4% |

1.身体検査 (1)BMI

| BMI (体重/身長 ²) (全体) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|------------------------|------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18kg/m ² 未満 | 25kg/m ² 以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . | . |
| 16~39 | 2,984 | 29.4 | 22.8 | 8.5% | 25.2% |
| 40~64 | 10,095 | 55.1 | 24.0 | 3.7% | 35.6% |
| 65~ | 19,525 | 73.4 | 23.9 | 2.8% | 35.2% |

| BMI (体重/身長 ²) (男性) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|------------------------|------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18kg/m ² 未満 | 25kg/m ² 以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . | . |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 23.7 | 6.0% | 32.5% |
| 40~64 | 3,608 | 55.4 | 24.8 | 1.7% | 43.9% |
| 65~ | 8,977 | 73.5 | 24.2 | 1.7% | 38.4% |

| BMI (体重/身長 ²) (女性) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|------------------------|------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18kg/m ² 未満 | 25kg/m ² 以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . | . |
| 16~39 | 1,810 | 30.2 | 22.2 | 10.2% | 20.5% |
| 40~64 | 6,487 | 54.9 | 23.5 | 4.8% | 31.0% |
| 65~ | 10,548 | 73.2 | 23.7 | 3.8% | 32.4% |

1.身体検査 (2)腹囲

| 腹囲 (cm) (全体) | | | |
|--------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 786 | 28.3 | 77.8 |
| 40~64 | 10,093 | 55.1 | 84.2 |
| 65~ | 12,831 | 69.7 | 84.9 |

| 腹囲 (cm) (男性) | | | | |
|--------------|---------|------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 85cm以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . |
| 16~39 | 368 | 28.4 | 81.5 | 34.5% |
| 40~64 | 3,608 | 55.4 | 87.1 | 56.3% |
| 65~ | 5,849 | 69.9 | 86.5 | 56.5% |

| 腹囲 (cm) (女性) | | | | |
|--------------|---------|------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90cm以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . |
| 16~39 | 418 | 28.2 | 74.6 | 8.1% |
| 40~64 | 6,485 | 55.0 | 82.6 | 22.4% |
| 65~ | 6,982 | 69.6 | 83.5 | 23.1% |

1.身体検査 (3) 血圧

| 収縮期血圧 (mmHg) (全体) | | | | |
|-------------------|---------|------|-------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,454 | 11.2 | 105.8 | 0.2% |
| 16~39 | 2,984 | 29.4 | 112.0 | 2.7% |
| 40~64 | 10,095 | 55.1 | 123.4 | 13.8% |
| 65~ | 19,529 | 73.4 | 131.0 | 26.0% |

| 収縮期血圧 (mmHg) (男性) | | | | |
|-------------------|---------|------|-------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,231 | 11.2 | 106.8 | 0.2% |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 117.2 | 4.8% |
| 40~64 | 3,608 | 55.4 | 126.7 | 17.0% |
| 65~ | 8,978 | 73.5 | 131.7 | 28.0% |

| 収縮期血圧 (mmHg) (女性) | | | | |
|-------------------|---------|------|-------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,223 | 11.3 | 104.8 | 0.1% |
| 16~39 | 1,810 | 30.2 | 108.6 | 1.4% |
| 40~64 | 6,487 | 54.9 | 121.6 | 12.0% |
| 65~ | 10,551 | 73.2 | 130.3 | 24.3% |

| 拡張期血圧 (mmHg) (全体) | | | | |
|-------------------|---------|------|------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,454 | 11.2 | 61.3 | 0.6% |
| 16~39 | 2,984 | 29.4 | 67.2 | 2.9% |
| 40~64 | 10,095 | 55.1 | 75.0 | 9.9% |
| 65~ | 19,529 | 73.4 | 73.5 | 6.8% |

| 拡張期血圧 (mmHg) (男性) | | | | |
|-------------------|---------|------|------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,231 | 11.2 | 61.4 | 0.8% |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 69.6 | 5.1% |
| 40~64 | 3,608 | 55.4 | 78.6 | 15.0% |
| 65~ | 8,978 | 73.5 | 74.7 | 8.2% |

| 拡張期血圧 (mmHg) (女性) | | | | |
|-------------------|---------|------|------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,223 | 11.3 | 61.3 | 0.3% |
| 16~39 | 1,810 | 30.2 | 65.6 | 1.5% |
| 40~64 | 6,487 | 54.9 | 73.0 | 7.2% |
| 65~ | 10,551 | 73.2 | 72.5 | 5.6% |

2.尿検査 (1)尿糖

| 尿糖 (全体) | | | |
|---------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 2,971 | 29.4 | 1.1% |
| 40~64 | 10,079 | 55.1 | 3.9% |
| 65~ | 19,501 | 73.4 | 4.4% |

| 尿糖 (男性) | | | |
|---------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 1.5% |
| 40~64 | 3,602 | 55.4 | 6.7% |
| 65~ | 8,963 | 73.5 | 6.8% |

| 尿糖 (女性) | | | |
|---------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,797 | 30.2 | 0.8% |
| 40~64 | 6,477 | 55.0 | 2.4% |
| 65~ | 10,538 | 73.2 | 2.4% |

2.尿検査 (2)尿蛋白

| 尿蛋白 (全体) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 2,971 | 29.4 | 2.3% |
| 40~64 | 10,079 | 55.1 | 1.5% |
| 65~ | 19,501 | 73.4 | 3.0% |

| 尿蛋白 (男性) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 2.5% |
| 40~64 | 3,602 | 55.4 | 2.1% |
| 65~ | 8,963 | 73.5 | 4.5% |

| 尿蛋白 (女性) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,797 | 30.2 | 2.2% |
| 40~64 | 6,477 | 55.0 | 1.1% |
| 65~ | 10,538 | 73.2 | 1.7% |

2.尿検査 (3)尿潜血

| 尿潜血 (全体) | | | | |
|----------|---------|------|--------|---------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 | (1+)以上で生理中を除く |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . |
| 16~39 | 2,969 | 29.4 | 6.4% | 2.5% |
| 40~64 | 10,076 | 55.1 | 5.8% | 4.6% |
| 65~ | 19,501 | 73.4 | 5.4% | 5.4% |

| 尿潜血 (男性) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,174 | 28.1 | 0.9% |
| 40~64 | 3,602 | 55.4 | 2.4% |
| 65~ | 8,963 | 73.5 | 3.8% |

| 尿潜血 (女性) | | | | |
|----------|---------|------|--------|---------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 | (1+)以上で生理中を除く |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . | . |
| 16~39 | 1,795 | 30.2 | 10.0% | 3.5% |
| 40~64 | 6,474 | 55.0 | 7.7% | 5.8% |
| 65~ | 10,538 | 73.2 | 6.8% | 6.8% |

3.末梢血液検査 (1)-1 赤血球

| 赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (全体) | | | |
|----------------------------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 4.68 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 4.80 |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 4.76 |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 4.60 |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 4.46 |

| 赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (男性) | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | $3.69 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下 | $3.99 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下 | $5.80 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以上 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 4.70 | - | 0.2% | 0.2% |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 4.92 | - | 0.3% | 1.0% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 5.18 | - | - | 4.9% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 4.89 | 0.8% | 2.6% | 2.4% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 4.63 | 3.1% | 8.9% | 0.8% |

| 赤血球数 ($10^6/\mu\text{L}$) (女性) | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | $3.39 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下 | $3.69 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以下 | $5.50 \times 10^6/\mu\text{L}$ 以上 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 4.65 | - | - | 0.9% |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 4.68 | - | 0.1% | 0.5% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 4.49 | 0.2% | 1.2% | 0.5% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 4.45 | 0.2% | 1.7% | 0.4% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 4.32 | 1.4% | 5.5% | 0.2% |

3.末梢血液検査 (1)-2 ヘモグロビン

| ヘモグロビン (g/dL) (全体) | | | |
|--------------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 12.5 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 13.6 |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 14.1 |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 13.9 |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 13.8 |

| ヘモグロビン (g/dL) (男性) | | | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------------|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 12.0g/dL以下 | 13.0g/dL以下 | 18.0g/dL以上 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 12.5 | 32.7% | 75.9% | - |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 13.8 | 3.7% | 22.7% | 0.2% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 15.6 | 0.3% | 0.9% | 0.9% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 15.1 | 1.1% | 3.9% | 0.9% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 14.5 | 4.4% | 13.3% | 0.5% |

| ヘモグロビン (g/dL) (女性) | | | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------------|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 11.0g/dL以下 | 12.0g/dL以下 | 16.0g/dL以上 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 12.5 | 3.5% | 27.7% | - |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 13.3 | 0.7% | 6.7% | - |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 13.1 | 6.0% | 14.9% | 0.2% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 13.2 | 4.5% | 12.6% | 0.5% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 13.1 | 3.1% | 14.9% | 0.4% |

3.末梢血液検査 (1)-3 ヘマトクリット

| ヘマトクリット (%) (全体) | | | |
|------------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 37.8 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 40.9 |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 42.4 |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 42.1 |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 41.8 |

| ヘマトクリット (%) (男性) | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 35.9%以下 | 37.9%以下 | 55.0%以上 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 37.7 | 26.5% | 54.6% | - |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 41.5 | 3.1% | 12.8% | 0.1% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 46.3 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 45.2 | 0.8% | 2.1% | 0.5% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 43.6 | 3.3% | 7.5% | 0.3% |

| ヘマトクリット (%) (女性) | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 28.9%以下 | 32.9%以下 | 48.0%以上 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 38.0 | - | 2.8% | 0.2% |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 40.3 | - | 0.4% | 0.1% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 39.9 | 0.2% | 2.2% | 0.5% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 40.4 | 0.5% | 2.2% | 0.7% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 40.2 | 0.3% | 1.8% | 0.8% |

3.末梢血液検査 (2)血小板数

| 血小板数 (10 ³ /μL) (全体) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 884 | 3.5 | 353.5 | - | 0.1% | 37.7% | 11.2% |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 289.8 | 0.0% | 0.2% | 8.8% | 1.3% |
| 16~39 | 2,978 | 29.4 | 266.9 | 0.1% | 0.4% | 5.4% | 0.6% |
| 40~64 | 10,080 | 55.1 | 256.5 | 0.1% | 0.6% | 4.2% | 0.7% |
| 65~ | 19,507 | 73.4 | 228.4 | 0.3% | 1.8% | 1.5% | 0.3% |

| 血小板数 (10 ³ /μL) (男性) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 454 | 3.4 | 351.3 | - | 0.2% | 36.1% | 11.5% |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 292.1 | - | 0.2% | 9.9% | 1.5% |
| 16~39 | 1,171 | 28.1 | 259.6 | - | 0.3% | 2.7% | 0.3% |
| 40~64 | 3,602 | 55.4 | 249.7 | 0.3% | 1.0% | 2.9% | 0.3% |
| 65~ | 8,972 | 73.5 | 220.5 | 0.2% | 2.4% | 1.3% | 0.3% |

| 血小板数 (10 ³ /μL) (女性) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 355.9 | - | - | 39.3% | 10.9% |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 287.5 | 0.1% | 0.1% | 7.7% | 1.1% |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 271.6 | 0.1% | 0.4% | 7.1% | 0.8% |
| 40~64 | 6,478 | 54.9 | 260.3 | 0.0% | 0.4% | 4.9% | 0.9% |
| 65~ | 10,535 | 73.2 | 235.1 | 0.3% | 1.3% | 1.7% | 0.3% |

3.末梢血液検査 (3)-1 白血球数

| 白血球数 (10 ³ /μL) (全体) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 8.6 | 0.1% | 0.5% | 28.8% | 14.1% |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 6.4 | 0.1% | 2.5% | 4.5% | 1.6% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 6.0 | 0.8% | 7.9% | 3.4% | 0.9% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 5.7 | 1.1% | 11.4% | 2.2% | 0.7% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 5.7 | 0.7% | 9.3% | 1.7% | 0.5% |

| 白血球数 (10 ³ /μL) (男性) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 8.7 | - | 0.4% | 32.0% | 14.9% |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 6.5 | 0.1% | 2.0% | 4.7% | 1.6% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 6.0 | 0.4% | 6.9% | 3.4% | 1.0% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 6.1 | 0.5% | 6.9% | 3.5% | 1.2% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 5.9 | 0.5% | 7.1% | 2.4% | 0.8% |

| 白血球数 (10 ³ /μL) (女性) | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 8.5 | 0.2% | 0.5% | 25.3% | 13.3% |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 6.4 | 0.1% | 3.0% | 4.3% | 1.6% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 5.9 | 1.0% | 8.5% | 3.4% | 0.9% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 5.4 | 1.4% | 13.9% | 1.5% | 0.4% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 5.5 | 0.9% | 11.1% | 1.1% | 0.3% |

3.末梢血液検査 (3)-2 白血球分画(好中球)

| 好中球数 (個/ μ L) (全体) | | | |
|------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 3,330 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 3,197 |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 3,469 |
| 40~64 | 10,083 | 55.1 | 3,216 |
| 65~ | 19,515 | 73.4 | 3,239 |

| 好中球数 (個/ μ L) (男性) | | | |
|------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 3,336 |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 3,165 |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 3,392 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 3,474 |
| 65~ | 8,973 | 73.5 | 3,411 |

| 好中球数 (個/ μ L) (女性) | | | |
|------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 3,325 |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 3,229 |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 3,520 |
| 40~64 | 6,479 | 54.9 | 3,073 |
| 65~ | 10,542 | 73.2 | 3,093 |

3.末梢血液検査 (3)-3 白血球分画(リンパ球)

| リンパ球数 (個/ μ L) (全体) | | | |
|-------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 4,465 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 2,557 |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 1,957 |
| 40~64 | 10,083 | 55.1 | 1,939 |
| 65~ | 19,515 | 73.4 | 1,916 |

| リンパ球数 (個/ μ L) (男性) | | | |
|-------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 4,525 |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 2,565 |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 2,022 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 2,037 |
| 65~ | 8,973 | 73.5 | 1,905 |

| リンパ球数 (個/ μ L) (女性) | | | |
|-------------------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 4,401 |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 2,549 |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 1,916 |
| 40~64 | 6,479 | 54.9 | 1,884 |
| 65~ | 10,542 | 73.2 | 1,926 |

3.末梢血液検査 (3)-4 白血球分画(単球)

| 単球数 (個/ μ L) (全体) | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 454 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 347 |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 318 |
| 40~64 | 10,083 | 55.1 | 308 |
| 65~ | 19,515 | 73.4 | 327 |

| 単球数 (個/ μ L) (男性) | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 471 |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 361 |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 340 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 353 |
| 65~ | 8,973 | 73.5 | 363 |

| 単球数 (個/ μ L) (女性) | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 436 |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 332 |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 304 |
| 40~64 | 6,479 | 54.9 | 283 |
| 65~ | 10,542 | 73.2 | 297 |

3.末梢血液検査 (3)-5 白血球分画(好酸球)

| 好酸球数 (個/ μ L) (全体) | | | |
|------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 323 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 280 |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 171 |
| 40~64 | 10,083 | 55.1 | 156 |
| 65~ | 19,515 | 73.4 | 153 |

| 好酸球数 (個/ μ L) (男性) | | | |
|------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 346 |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 327 |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 199 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 184 |
| 65~ | 8,973 | 73.5 | 177 |

| 好酸球数 (個/ μ L) (女性) | | | |
|------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 300 |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 233 |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 152 |
| 40~64 | 6,479 | 54.9 | 141 |
| 65~ | 10,542 | 73.2 | 133 |

3.末梢血液検査 (3)-6 白血球分画(好塩基球)

| 好塩基球数 (個/ μ L) (全体) | | | |
|-------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 886 | 3.5 | 39 |
| 7~15 | 2,446 | 11.2 | 36 |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 37 |
| 40~64 | 10,083 | 55.1 | 39 |
| 65~ | 19,515 | 73.4 | 37 |

| 好塩基球数 (個/ μ L) (男性) | | | |
|-------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 456 | 3.4 | 42 |
| 7~15 | 1,227 | 11.2 | 39 |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 39 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 43 |
| 65~ | 8,973 | 73.5 | 39 |

| 好塩基球数 (個/ μ L) (女性) | | | |
|-------------------------|---------|------|-----|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | 430 | 3.5 | 37 |
| 7~15 | 1,219 | 11.3 | 33 |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 36 |
| 40~64 | 6,479 | 54.9 | 37 |
| 65~ | 10,542 | 73.2 | 35 |

4.血液生化学 (1)-1 肝機能(AST)

| AST (U/L) (全体) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 23.7 | 10.2% | 0.7% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 21.8 | 9.6% | 2.8% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 24.2 | 14.3% | 3.0% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 25.3 | 15.6% | 2.5% |

| AST (U/L) (男性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 25.3 | 14.5% | 1.1% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 26.5 | 18.5% | 5.0% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 27.1 | 22.2% | 4.7% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 26.4 | 19.8% | 3.3% |

| AST (U/L) (女性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 22.2 | 5.9% | 0.4% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 18.7 | 3.8% | 1.3% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 22.6 | 9.9% | 2.0% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 24.3 | 12.1% | 1.8% |

4.血液生化学 (1)-2 肝機能(ALT)

| ALT (U/L) (全体) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 15.9 | 4.6% | 1.7% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 23.7 | 17.5% | 8.1% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 24.5 | 20.8% | 6.7% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 21.5 | 13.2% | 3.1% |

| ALT (U/L) (男性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 18.4 | 7.0% | 2.7% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 35.1 | 35.4% | 16.8% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 30.8 | 34.8% | 11.7% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 23.5 | 17.8% | 4.1% |

| ALT (U/L) (女性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 13.3 | 2.2% | 0.7% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 16.3 | 5.9% | 2.4% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 21.0 | 13.1% | 3.9% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 19.7 | 9.3% | 2.2% |

4.血液生化学 (1)-3 肝機能(γ -GT)

| γ -GT (U/L) (全体) | | | | | |
|-------------------------|---------|------|------|----------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 14.3 | 0.7% | 0.1% |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 25.7 | 10.0% | 2.5% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 39.5 | 18.9% | 6.1% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 33.8 | 13.8% | 3.6% |

| γ -GT (U/L) (男性) | | | | | |
|-------------------------|---------|------|------|----------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 15.7 | 1.2% | 0.2% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 38.1 | 21.0% | 5.7% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 59.6 | 34.5% | 12.1% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 44.1 | 22.0% | 6.3% |

| γ -GT (U/L) (女性) | | | | | |
|-------------------------|---------|------|------|----------|-----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 12.9 | 0.2% | - |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 17.6 | 2.9% | 0.4% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 28.3 | 10.2% | 2.8% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 25.0 | 6.8% | 1.3% |

4.血液生化学 (2)-1 脂質(LDLコレステロール)

| LDL-C (mg/dL) (全体) | | | | | |
|--------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 91.8 | 11.0% | 2.9% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 110.1 | 33.5% | 15.7% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 124.1 | 54.0% | 29.1% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 116.0 | 42.6% | 20.1% |

| LDL-C (mg/dL) (男性) | | | | | |
|--------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 90.5 | 10.7% | 2.6% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 114.7 | 40.4% | 21.8% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 121.9 | 51.9% | 26.8% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 112.3 | 38.7% | 17.0% |

| LDL-C (mg/dL) (女性) | | | | | |
|--------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 93.2 | 11.2% | 3.2% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 107.0 | 29.0% | 11.8% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 125.4 | 55.2% | 30.4% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 119.1 | 46.0% | 22.7% |

4.血液生化学 (2)-2 脂質(中性脂肪)

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (全体) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 81.5 | 9.0% | 0.8% |
| 16~39 | 2,979 | 29.4 | 89.2 | 11.6% | 1.7% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 115.0 | 20.4% | 2.8% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 110.7 | 17.9% | 1.5% |

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (男性) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 82.2 | 11.1% | 1.2% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 111.9 | 19.9% | 3.5% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 141.7 | 31.5% | 5.3% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 116.4 | 21.0% | 2.2% |

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (女性) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 80.7 | 7.0% | 0.5% |
| 16~39 | 1,807 | 30.2 | 74.5 | 6.2% | 0.6% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 100.2 | 14.2% | 1.4% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 105.8 | 15.2% | 0.8% |

4.血液生化学 (2)-3 脂質(HDLコレステロール)

| HDL-C (mg/dL) (全体) | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 60.8 | 3.0% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 62.0 | 4.6% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 63.4 | 4.2% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 60.2 | 5.6% |

| HDL-C (mg/dL) (男性) | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 60.7 | 3.0% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 55.4 | 8.8% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 56.7 | 8.5% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 56.4 | 9.0% |

| HDL-C (mg/dL) (女性) | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 60.9 | 3.0% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 66.2 | 1.8% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 67.1 | 1.8% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 63.4 | 2.6% |

4.血液生化学 (3)-1 糖(空腹時血糖)

| 空腹時血糖値 (mg/dL) (全体) | | | | | | |
|---------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,609 | 11.4 | 86.9 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 16~39 | 2,634 | 29.3 | 89.4 | 2.5% | 1.1% | 0.4% |
| 40~64 | 9,132 | 55.1 | 99.1 | 14.9% | 5.0% | 1.4% |
| 65~ | 16,795 | 73.1 | 104.6 | 25.9% | 8.8% | 2.0% |

| 空腹時血糖値 (mg/dL) (男性) | | | | | | |
|---------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 792 | 11.4 | 87.5 | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 16~39 | 1,022 | 28.2 | 91.5 | 3.6% | 1.5% | 0.5% |
| 40~64 | 3,224 | 55.3 | 103.8 | 22.9% | 8.3% | 2.4% |
| 65~ | 7,692 | 73.3 | 107.9 | 33.1% | 12.0% | 2.8% |

| 空腹時血糖値 (mg/dL) (女性) | | | | | | |
|---------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 817 | 11.5 | 86.2 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16~39 | 1,612 | 30.0 | 88.0 | 1.7% | 0.9% | 0.3% |
| 40~64 | 5,908 | 54.9 | 96.5 | 10.5% | 3.2% | 0.9% |
| 65~ | 9,103 | 72.9 | 101.9 | 19.9% | 6.0% | 1.2% |

4.血液生化学 (3)-2 糖(HbA1c)

| HbA1c (%) (NGSP) (全体) | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,411 | 11.2 | 5.3 | 0.5% | 0.0% | - |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 5.3 | 2.4% | 0.8% | 0.4% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 5.7 | 17.5% | 3.8% | 1.5% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 5.9 | 31.1% | 5.7% | 1.3% |

| HbA1c (%) (NGSP) (男性) | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,209 | 11.2 | 5.3 | 0.7% | 0.1% | - |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 5.3 | 2.4% | 0.9% | 0.5% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 5.7 | 21.4% | 5.6% | 2.2% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 5.9 | 33.4% | 7.3% | 1.7% |

| HbA1c (%) (NGSP) (女性) | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 5.3 | 0.4% | - | - |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 5.3 | 2.4% | 0.7% | 0.3% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 5.6 | 15.3% | 2.9% | 1.1% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 5.8 | 29.2% | 4.3% | 1.0% |

4.血液生化学 (4)-1 腎機能(血清クレアチニン)

| 血清クレアチニン (mg/dL) (全体) | | | |
|-----------------------|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 0.49 |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 0.70 |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 0.74 |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 0.80 |

| 血清クレアチニン (mg/dL) (男性) | | | | | |
|-----------------------|---------|------|------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 1.15mg/dL以上 | 1.35mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 0.50 | - | - |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 0.83 | 1.0% | 0.1% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 0.89 | 3.6% | 1.1% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 0.93 | 10.2% | 3.9% |

| 血清クレアチニン (mg/dL) (女性) | | | | | |
|-----------------------|---------|------|------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 0.95mg/dL以上 | 1.15mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 0.47 | - | - |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 0.61 | - | - |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 0.66 | 1.0% | 0.4% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 0.69 | 4.6% | 1.4% |

4.血液生化学 (4)-2 腎機能(eGFR)

| eGFR (mL/min/1.73m ²) (全体) | | | |
|--|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 94.8 |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 74.6 |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 65.6 |

| eGFR (mL/min/1.73m ²) (男性) | | | |
|--|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 94.4 |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 74.2 |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 65.3 |

| eGFR (mL/min/1.73m ²) (女性) | | | |
|--|---------|------|------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 95.2 |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 74.9 |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 65.8 |

4.血液生化学 (4)-3 腎機能(尿酸)

| 尿酸 (mg/dL) (全体) | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 7.1mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,414 | 11.2 | 4.6 | 3.5% | 1.0% |
| 16~39 | 2,980 | 29.4 | 5.1 | 9.8% | 3.9% |
| 40~64 | 10,085 | 55.1 | 5.1 | 8.9% | 2.8% |
| 65~ | 19,518 | 73.4 | 5.2 | 8.9% | 2.5% |

| 尿酸 (mg/dL) (男性) | | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 7.1mg/dL以上 | 7.9mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,212 | 11.2 | 4.9 | 6.4% | 2.3% | 1.8% |
| 16~39 | 1,172 | 28.1 | 6.2 | 23.0% | 10.9% | 9.6% |
| 40~64 | 3,604 | 55.4 | 6.1 | 21.6% | 8.1% | 6.9% |
| 65~ | 8,974 | 73.5 | 5.8 | 15.9% | 5.4% | 4.8% |

| 尿酸 (mg/dL) (女性) | | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 5.6mg/dL以上 | 7.1mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,202 | 11.3 | 4.3 | 8.3% | 0.6% | 0.1% |
| 16~39 | 1,808 | 30.2 | 4.4 | 12.2% | 1.2% | 0.3% |
| 40~64 | 6,481 | 54.9 | 4.6 | 17.9% | 1.9% | 0.5% |
| 65~ | 10,544 | 73.2 | 4.7 | 21.7% | 3.0% | 0.6% |

県民健康調査「健康診査」受診状況と実施状況

1 平成23年度～令和元年度の受診状況

(1) 実施方法及び受診場所（県内・県外）別受診者数

ア 15歳以下

(単位:人、%)

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 確報値 平成24年9月11日 | 確報値 平成25年7月5日 | 確報値 平成26年9月1日 | 確報値 平成27年9月1日 | 確報値 平成28年9月1日 | 確報値 平成29年12月31日 | 確報値 平成30年3月31日 | 確報値 平成31年3月31日 | 確報値 令和2年3月31日 |
| 対象者数 | 27,819 | 27,077 | 26,474 | 25,883 | 25,296 | 24,600 | 23,660 | 22,744 | 21,580 |
| 県内小児健診 | 15,002 | 9,534 | 8,432 | 7,432 | 6,206 | 5,193 | 4,474 | 3,648 | 2,857 |
| 県外小児健診 | 2,949 | 2,283 | 1,822 | 1,792 | 1,403 | 1,226 | 929 | 834 | 650 |
| 上記のうち 重複受診者数 | 17 | 37 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 (重複受診者数を除く) | 17,934 | 11,780 | 10,248 | 9,216 | 7,603 | 6,413 | 5,403 | 4,479 | 3,504 |
| 受診率(%) | 64.5% | 43.5% | 38.7% | 35.6% | 30.1% | 26.1% | 22.8% | 19.7% | 16.2% |

イ 16歳以上

(単位:人、%)

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 確報値 平成24年9月11日 | 確報値 平成25年7月5日 | 確報値 平成26年9月1日 | 確報値 平成27年9月1日 | 確報値 平成28年9月1日 | 確報値 平成29年12月31日 | 確報値 平成30年3月31日 | 確報値 平成31年3月31日 | 確報値 令和2年3月31日 |
| 対象者数 | 182,370 | 184,910 | 186,970 | 188,328 | 190,019 | 191,101 | 191,636 | 191,974 | 192,651 |
| 県内市町村が実施 する総合健診 | 8,798 | 23,907 | 25,604 | 25,913 | 26,195 | 26,636 | 26,411 | 26,140 | 25,255 |
| 県内個別健診 | — | 6,692 | 5,806 | 4,927 | 4,443 | 3,941 | 3,782 | 3,730 | 2,869 |
| 県内集団健診 | 41,949 | 10,603 | 6,767 | 5,808 | 5,183 | 4,341 | 3,963 | 3,776 | 2,444 |
| 県外個別健診 | 3,815 | 3,055 | 3,205 | 3,418 | 3,332 | 2,118 | 2,102 | 2,087 | 1,988 |
| その他 ※1、※2 | 2,045 | 3,206 | 2,017 | 1,846 | 2,113 | 3,011 | 3,154 | 3,122 | 3,001 |
| 上記のうち 重複受診者数 | 208 | 454 | 359 | 38 | 55 | 57 | 45 | 40 | 32 |
| 合計 (重複受診者数を除く) | 56,399 | 47,009 | 43,040 | 41,874 | 41,211 | 39,990 | 39,367 | 38,815 | 35,525 |
| 受診率(%) | 30.9% | 25.4% | 23.0% | 22.2% | 21.7% | 20.9% | 20.5% | 20.2% | 18.4% |

※1 その他(県内で実施(市町村が都市医師会、医療機関に委託))

※2 その他(県外で実施(市町村が健診代行機関に委託))

【参考】令和元年度 受診者の健診案内送付先別（県内・県外）受診者数*

| (15歳以下) | 県内 | 県外 | 合計 | (16歳以上) | 県内 | 県外 | 合計 |
|---------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|
| | 対象者数(人) | 17,755 | 3,825 | | 21,580 | 対象者数(人) | 161,933 |
| 受診者数(人) | 2,854 | 650 | 3,504 | 受診者数(人) | 32,339 | 3,186 | 35,525 |
| 受診率 | 16.1% | 17.0% | 16.2% | 受診率 | 20.0% | 10.4% | 18.4% |

* 健診案内送付先の住所等を基に県内・県外を分けた。実施方法及び受診場所（県内・県外）別受診者数とは異なる。

2 令和2年度の実施状況【令和3年1月31日現在】

対象者：213,873人（15歳以下20,515人、16歳以上193,358人）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----|----|----|--|------------------------------------|----|----|-----|-----|-------------------|----------------------------|----|----|
| 15歳以下 | 県内 | | | | 県内指定医療機関での小児健診 受診者数 2,335人(速報値) | | | | | | | | |
| | 県外 | | | | 県外指定医療機関での小児健診 受診者数 444人(速報値) | | | | | | | | |
| 16歳以上 | 県内 | | | 市町村が実施する特定健診・総合健診での上乗せ健診 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、榑葉町、富岡町 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村 受診者数 19,015人(速報値) | | | | | | 集団健診 1月12日より実施 | | | |
| | 県外 | | | | 県外指定医療機関での健診 受診者数 1,847人(速報値) | | | | | | 医療機関での 個別健診 1月4日より実施 | | |