

33 トルコギキョウの二度切り栽培における一番花終了後の芽整理時期の違いと二番花の収穫時期

福島県農業試験場会津支場・平成12年度農業試験場試験成績概要

1 部門名 花き—トルコギキョウ—作型・栽培型 分類コード 05—19—18000000

2 担当者 小林祐一・江川孝二

3 要 旨

据え置き越冬株を利用した二度切り栽培における一番花終了後の芽整理時期が、二番花の収穫時期や切り花品質に与える影響について検討した。

(1) 9月上旬～9月中旬にかけて一番花を収穫した切り下株を10月22日～12月10日まで約10日ごとに地際に近い芽を1株当たり2芽残し整理をした。さらに、抽苔後の3月8日に1株当たり2本を上限として、㎡当たり69.4本(定植本数と同数)に整理した。

(2) 二番花の平均収穫日は、6月26～28日の範囲にあり、約50日にわたって一番花終了後の芽整理を行っても、差はほとんどなかった。

(3) 二番花の切り花品質は、切り花長が100.1～109.2cm、切り花重が162.8～178.2g、節数が19.3～19.9節、花蕾数が23.6～26.0輪の範囲にあり、大きな差は認められなかった。

以上のことから、一番花終了後の切り下株の芽整理時期が違っても、二番花の収穫時期や切り花品質に大きな差はなかった。