


「県南地域感染症情報」に関する御意見、御質問等はFAXまたはメールでお願いします。

県南保健所生活衛生部医療薬事課

FAX0248-23-1252 メールアドレス kansen_kennan@pref.fukushima.lg.jp

6月は蚊の幼虫が発生する時期です発生しないよう注意!!



ジカ熱・デング熱の運び屋 ヒトスジシマカの発生源を叩け!

ジカ熱・デング熱対策



- 蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発生しそうな周辺の水たまりの除去・清掃をしましょう!
- 下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう!

水たまり除去・清掃



植木鉢の皿



雨除けのブルーシートや古タイヤに溜まった水たまり



雨ざらしの用具



屋外に放置された空きビン・缶・ペットボトル

下草刈り



風通しの悪いやぶ・草むら

公園、学校、寺社、空海港、駅などの施設を管理されている方もご協力をお願いします!



詰まった排水溝

●なぜ対策が必要?

ジカ熱やデング熱は蚊を介して感染します。原因となるウイルスは、感染した人の血を吸った蚊(日本ではヒトスジシマカ)の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うとせにウイルスを移し、感染を広げていきます。

●ジカ熱やデング熱に感染するとどうなる?

感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が1週間ほど出ます。また、ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害をもった子どもが生まれたり、デング熱では出血を伴うデング出血熱となり重症化することがあります。



【ヒトスジシマカ】
蚊科ヒトスジシマカ属に属する。日本ではヒトスジシマカが唯一の媒介種として知られる。成虫は夜間活動し、人間の血を吸う。繁殖力は非常に強く、1匹のメスが一生を通じて数百個の卵を産む。

ジカ熱・デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

ジカ熱 厚生労働省 検索



デング熱 厚生労働省 検索



- ◆ 予防方法 ◆ 蚊に刺されないようにしましょう。
 - ・長袖、長ズボンを着用する。
 - ・素足でのサンダル履き等は避ける。
 - ・虫よけ剤の使用等によって、蚊に刺されないようにする。
- 蚊幼虫(ポウフラ)の発生源を作らないよう注意しましょう。
 - ・1週間に一度は雨水がたまった容器を逆さにして水をなくす。
 - ・人工容器などに水がたまらないように整頓する。

《 医療機関の方へ 》

ジカウイルス感染症やデング熱は、感染症法の四類感染症です。診断した場合は、直ちに届出をお願いします。なお、疑いのある患者を診察した場合は、当所に御連絡ください。

県南保健福祉事務所 0248-22-6405

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

注意:風しんの感染を拡大させる可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人をまもるために風しんに対す抵抗力を確認・獲得しましょう。1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料となります。

問い合わせ先:お住まいの市町村