


## 冬に特に多い！ 感染性胃腸炎にご注意を！


感染性胃腸炎の中でも、ノロウイルスによる胃腸炎は1年を通して発生していますが、特に冬季に流行しています。その感染経路のほとんどが経口感染です。

### ○ノロウイルスの感染経路

下水等でノロウイルスに汚染されたカキや二枚貝等



## 県南地域における感染性胃腸炎報告数



県南地域では、第5週(令和6年1月29日～2月4日)4定点医療機関(小児科)から31件の報告がありました。

定点医療機関あたりの報告数は、県南地域で7.75、福島県で5.08と、県南地域で高い値でした。

## 汚染物・場所の消毒

○次亜塩素酸ナトリウムは多くの細菌・ウイルスに有効です。(結核菌や一部の真菌では無効)

※次亜塩素酸ナトリウム(市販の漂白剤:塩素濃度約5%の場合)の希釈方法

消毒対象	濃度 (希釈倍率)	希釈方法
便や吐物が付着した床等、衣類等の浸け置き	0.1% (1000ppm)	500mlのペットボトル1本の水に10ml (ペットボトルのキャップ2杯)
食器等の浸け置き、トイレの便座やドアノブ、手すり、床等	0.02% (200ppm)	500mlのペットボトル1本の水に2ml (ペットボトルのキャップ半杯)

FAX

MAIL

発行元：福島県県南保健所生活衛生部医療薬事課

0248-23-1252

kansen\_kennan@pref.fukushima.lg.jp

「県南地域感染症情報」に関する御意見、御質問等はFAX及びメールでお願いします。

県南保健福祉事務所ホームページ <https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21130a/>