

だいち通信 第2号 (通算64号)

(令和6年6月発行)

会津若松市・磐梯町・猪苗代町・JA会津よつば(あいづ地区)
福島県農業共済組合会津支所・JA全農福島県本部
福島県会津農林事務所農業振興普及部

国産大豆の需要が高まっています!

東北地方 今後1ヶ月(6/15~7/14) 天候の見通し

- 暖かい空気に覆われやすいため、向こう1ヶ月の気温は高いでしょう。
- 特に期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。
- 降水量は、ほぼ平年並の見込みです。

気温 10 10 80

降水量 20 30 50

日照時間 30 40 30

低い(少ない) 平年並 高い(多い)

☑今回の栽培ポイント


- ①中耕培土 ②雑草対策(茎葉処理) ③湿害対策

1 中耕培土

基本的に2回、大豆の生育に応じて行いましょう。

中耕培土の効果

- ①培土部分からの不定根の発生を促進し、養水分の吸収が向上します。
- ②不定根に着生する根粒菌の窒素固定が期待できます。
- ③倒伏防止効果が期待できます。
- ④土壌の通気性が改善され、根粒菌や根の発育が良くなります。
- ⑤土壌をかくはんし、雑草の発生を抑えます。



1回目

時期：大豆3~4葉期
高さ：子葉節が隠れる高さまで

2回目

時期：大豆5~6葉期
高さ：初生葉が隠れる高さまで

最後の中耕・培土は開花期の10日前までには終わらせましょう。

!! 農作業中の熱中症に注意しましょう!!
これから本格的な夏季を迎えます。
作業前・作業中はこまめな水分補給や休憩をとりましょう。



2 除草対策

土壌処理剤→**茎葉処理剤**→中耕培土(2回)→大豆茎葉による畝間の遮へい

茎葉処理剤 ～雑草に合わせて散布しましょう～

ナブ乳剤

ポルトフロアブル

- ・イネ科雑草



大豆バサグラン液剤 (ナトリウム塩)

- ・イヌタデ
- ・アメリカセンダングサ
- ・スベリヒユ



アタックショット 乳剤

- ・ホソアオゲイトウ
- ・シロザ
- ・イヌホオズキ




後発雑草対策【大豆バサグラン液剤(ナトリウム塩)の散布ポイント】

雑草が育ってしまうと茎葉処理剤は効きにくくなります。
雑草の大きさに注意し、散布が遅れないようにしましょう。

防除適期：大豆2～3葉期（播種後約20～30日後程度）

遅くとも..雑草6葉期までに散布しましょう。



注目! 播種後すぐに散布できる除草剤があります！

降雨で土壌処理剤が散布できなかった…



大豆が小さくて茎葉処理剤が
散布できない…

パワーガイザー液剤

使用時期

出芽直前～3葉期まで

効果のある雑草

- ・タデ科
- ・シロザ
- ・イネ科

3 湿害対策

大豆は湿害に弱い作物です

～湿害により葉の黄化がみられた場合～

硫安や尿素の追肥を行きましょう

10aあたり) 硫安：5～10kg 尿素：2～5kg