

平成23～27年度 県民健康調査「健康診査」 健診項目別受診実績基礎統計表

【対象】

平成23年時指定の避難区域等の住民及び基本調査の結果必要と認められた方

【避難区域等】

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の全域及び伊達市の一部（特定避難勧奨地点の属する区域）

【健診項目】

| 年齢区分 | 健診項目 |
|---------------------------|--|
| 0歳～6歳 (就学前乳幼児) | 身長、体重、 血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） |
| 7歳～15歳 (小学校1年生～中学校3年生) | 身長、体重、血圧、 血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） [希望による追加項目] 血液生化学（AST、ALT、 γ -GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 血清クレアチニン、尿酸） |
| 16歳以上 | 身長、体重、腹囲（又はBMI）、血圧、 血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画） 尿検査（尿蛋白、尿糖、尿潜血） 血液生化学（AST、ALT、 γ -GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、 血清クレアチニン、eGFR、尿酸） ※下線部は、通常、特定健康診査では検査しない追加項目 |

※平成23～27年度の健診結果については、一般的年齢区分と「健康診査」の健診項目の違いにより0～6歳、7～15歳、16～39歳、40～64歳、65歳以上の5つの年齢に区分し、それぞれ健診項目毎に結果をグラフ化した。

※平成27年度の健診結果については、上記の方法による区分に加え、さらに性別による2区分とかけ合わせ10区分とし、それぞれ健診項目毎に結果を集計した。

※集計結果には、同一年度に2回以上受診をした方（重複受診者）については、受診日が早い方の健診結果1回分のみを含めている。

※集計結果の基礎統計表の表章記号の規約は、厚生労働省の人口動態調査と同様に表記した。

| | |
|------------------------------|------|
| 計数がない場合 | — |
| 統計項目のない場合（年齢区分によって健診項目がない場合） | • |
| 計数を表章することが不適当な場合 | … |
| 比率が微小（0.05未満）の場合 | 0.0% |

※統計的な検定は行っていない。

※平成23年度と平成24年度～平成27年度では、健診対象者に大きな変わりはないが、健診受診者は異なり、健診を受けた時期や医療機関なども異なっているなど、多くの修飾要因が存在するため、厳密な意味での比較ではない。

〈参考〉小児健康診査実施時期（0～15歳）

平成23年度：平成24年1月～3月

平成25年度：平成25年7月～12月

平成27年度：平成27年7月～12月

平成24年度：平成24年7月～12月

平成26年度：平成26年7月～12月

【各健診項目のまとめ】

※参考資料

第21回「県民健康調査」検討委員会 資料3-2



平成23～26年度県民健康調査「健康診査」健診項目別受診実績基礎統計表

- (1) 体重は、15歳以下の年齢区分では平成23年度から平成24年度に僅かに減少し、その後ほとんど変化せず、16～39歳では平成23年度から平成26年度まで変化なく平成27年度になって僅かに減少、40～64歳では変化なく、65歳以上では平成23年度以降微増した。過体重者の割合は男性では平成23年度以降変化なかったが、女性では40歳以上の年齢区分で漸増した。
- (2) BMIが25kg/m²以上の過体重者は、平成23年度は16～39歳において22.3%を占め、年齢とともに増加、65歳以上では37.0%を占めた。各年齢層で女性に比べ男性の過体重の割合が多く、その割合は平成23年度から平成25年度にかけてほとんど変化はみられなかった。平成25年度から平成26年度にかけては各年齢層において低下傾向がみられたが、平成26年度から平成27年度にかけては男性の各年齢層において上昇傾向がみられた。全体では40～64歳において32.9%に上昇、65歳以上は34.0%に低下した。
- (3) 腹囲は、40歳以上の年齢区分において平成23年度以降ほとんど変化しなかったが、16～39歳の年齢区分では漸減した。腹部内臓脂肪肥満の割合（腹囲高値者）は、40歳以上の年齢区分の男女で平成23年度以降ほとんど変化しなかったが、16～39歳の年齢区分では、男女とも平成27年度は平成23年度に比べ減少した。
- (4) 高血圧者（収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上）の割合は40歳以上で男女ともに平成23年度から平成26年度まで経年的に減少したが、平成27年度は平成26年度に比べて軽度増加した。39歳以下では男女ともに高血圧者の割合は低いが、平成23年度に比べ、平成24～27年度はより低かった。あらゆる年齢層で女性に比べ男性の高血圧者の割合が多かった。
- (5) 尿糖（1+）以上の尿糖陽性の割合は、平成23年度と比較して平成27年度は各年齢層において低値であった。
- (6) 尿蛋白（1+）以上の割合は、平成23年度と比較して平成27年度は各年齢層において高値であった。
- (7) 生理中を除いた尿潜血（1+）以上の割合は、どの年齢層においても男女ともに平成23年度と比べ平成27年度に明らかな増加は認めなかった。
- (8) 男性で腎機能低下を示す血清クレアチニン1.15mg/dL以上の割合は、平成23年度は40～64歳と65歳以上でそれぞれ2.4%、7.6%であったのに対して、平成24年度以降も高い割合が続き、平成27年度もそれぞれ3.2%、9.0%と高い割合が持続していた。
- (9) 腎機能低下を示すeGFR60mL/min/1.73m²未満の割合は、平成23年度は40～64歳と65歳以上でそれぞれ6.6%、28.6%であったのに対して、平成24年度以降も高い割合が続き、平成27年度も10.9%、34.4%と高い割合が持続していた。男女ともに同様の傾向であった。
- (10) 空腹時血糖値110mg/dL以上の耐糖能異常の割合は、平成23年度と比べてすべての年齢層で平成27年度は減少傾向を認めた。



- (11) HbA1c6.0%以上の耐糖能異常の割合は、平成23年度は40～64歳と65歳以上でそれぞれ11.8%、18.7%であったのに対して、平成27年度は15.0%、24.8%と上昇傾向であった。しかし、HbA1c7.0%以上の血糖管理不良の割合は、平成23年度と比べ平成27年度は減少傾向を認めた。
- (12) 脂質代謝異常である120mg/dL以上のLDLコレステロール血症、150mg/dL以上の中性脂肪血症、及び40mg/dL未満のHDLコレステロール血症は、平成23年度では7～15歳の若年者でそれぞれ13.3%、7.0%、2.9%を占め、年齢と共に増加した。65歳以上ではその割合は平成24年度にやや減少を認め、その後は平成27年度まで横ばいである。一方、7～15歳の若年者で高中性脂肪血症は、平成26年度まで漸増傾向を認めたが、平成27年度は減少した。
- (13) AST、ALT、 γ -GTが基準値以上の肝機能異常者は平成23年度から平成24年度にかけ増加を認めたが、平成25年度には平成23年度並みの頻度となり、さらに平成26年度は平成25年度に比べ低下した。平成27年度は平成26年度と比べ微増も、平成25年度と同程度であった。
- (14) 尿酸値が7.1mg/dL以上の高尿酸血症者は、平成23年度は男性7～15歳で4.7%、16～39歳で18.5%、40～64歳で18.1%だった。各年齢層で女性に比べ男性の高尿酸血症者の割合が著明に多く、その割合は平成23年度から平成26年度にかけて65歳以上を除く各年齢層において増加傾向がみられた。平成26年度から平成27年度にかけては、男性7～15歳で6.0%、40～64歳で20.9%と引き続き増加傾向がみられ、65歳以上においても16.4%と増加傾向がみられた。
- (15) 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット：平成23、24、25、26、27年度を通じて各年齢層の平均値に大きな変化は認めない。また、ヘモグロビンは、16歳以上で平成24、25、26年度と増加傾向にあったものが平成27年度は減少傾向にある。
- (16) 血小板数：平成23、24、25、26、27年度を通じて各年齢層の平均値に大きな変化は認めない。
- (17) 白血球数は、平成23、24、25、26、27年度を通じて各年齢層の平均値に大きな変化は認めない。またリンパ球数500/ μ L以下の割合の増加も認めない。
さらに白血球分画では、好中球数、リンパ球数、単球数、好酸球数、好塩基球数の平均値には、各年齢層において、平成23、24、25、26、27年度を通じて大きな変化は認めない。
小児においては、平成23年度と比較して平成24、25、26、27年度は、赤血球数、白血球数、血小板数の値に変化はみられなかった。

【各健診項目のまとめグラフ】



(1) 過体重者の割合







(2) BMIが25kg/m²の過体重者の割合




(3) 腹部内臓脂肪肥満の割合(腹囲高値者)




(4) 高血圧者の割合




(5) 尿糖(1+)以上の尿糖陽性の割合





(6) 尿蛋白(1+)以上の割合





(7) 尿潜血(1+)以上の割合





(8) 血清クレアチニン(男性) 1.15mg/dL以上の割合と(女性) 0.95mg/dL以上の割合





(9) eGFR60mL/min/1.73m²未満の割合






(10) 耐糖能異常(空腹時血糖値110mg/dL以上)の割合






(11) 耐糖能異常 (HbA1c6.0%以上)、血糖管理不良者 (HbA1c7.0%以上) の割合





(12) 脂質代謝異常 (LDL-C(120mg/dL以上、中性脂肪150mg/dL以上、HDL-C(40mg/dL未満) の割合











(13) 肝機能異常者 (AST 31U/L以上、ALT 31U/L以上、γ-GT 51U/L以上) の割合






(14) 高尿酸血症者（尿酸値7.1mg/dL以上）の割合




(15)～(17)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、白血球数、白血球分画の平均値（リンパ球数の割合を含む）





身長




平成27年度

| 身長 (cm) (全体) | | | |
|--------------|---------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
| 0～6 | 2,654 | 3.8 | 96.9 |
| 7～15 | 4,898 | 10.9 | 142.2 |
| 16～39 | 5,346 | 29.2 | 162.7 |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 160.2 |
| 65～ | 19,541 | 73.3 | 154.9 |

| 身長 (cm) (男性) | | | | | |
|--------------|---------|------|-------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150cm以下 | 170cm以上 |
| 0～6 | 1,309 | 3.8 | 96.9 | … | … |
| 7～15 | 2,554 | 11.0 | 143.7 | … | … |
| 16～39 | 1,891 | 28.0 | 170.9 | 0.5% | 57.3% |
| 40～64 | 5,470 | 55.5 | 168.1 | 0.2% | 37.8% |
| 65～ | 8,862 | 73.3 | 162.0 | 2.8% | 10.0% |

| 身長 (cm) (女性) | | | | | |
|--------------|---------|------|-------|---------|---------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140cm以下 | 160cm以上 |
| 0～6 | 1,345 | 3.9 | 96.8 | … | … |
| 7～15 | 2,344 | 10.9 | 140.7 | … | … |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 158.2 | 0.2% | 37.7% |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 155.5 | 0.4% | 21.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 149.1 | 6.6% | 2.7% |

体重




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0～6 | 2,654 | 3.8 | 15.4 |
| 7～15 | 4,898 | 10.9 | 38.0 |
| 16～39 | 5,346 | 29.2 | 59.8 |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 61.1 |
| 65～ | 19,549 | 73.3 | 57.3 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 50kg以下 | 70kg以上 |
|-------|---------|------|------|--------|--------|
| 0～6 | 1,309 | 3.8 | 15.5 | … | … |
| 7～15 | 2,554 | 11.0 | 39.0 | … | … |
| 16～39 | 1,891 | 28.0 | 68.6 | 4.8% | 38.7% |
| 40～64 | 5,470 | 55.5 | 69.3 | 1.9% | 43.3% |
| 65～ | 8,865 | 73.3 | 63.1 | 7.4% | 22.1% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 45kg以下 | 65kg以上 |
|-------|---------|------|------|--------|--------|
| 0～6 | 1,345 | 3.9 | 15.3 | … | … |
| 7～15 | 2,344 | 10.9 | 36.9 | … | … |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 55.0 | 13.8% | 14.3% |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 56.3 | 9.9% | 17.1% |
| 65～ | 10,684 | 73.2 | 52.5 | 19.0% | 8.1% |

BMI




平成27年度

| BMI (体重/身長 ²) (全体) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18未満 | 25以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 5,346 | 29.2 | 22.5 | 9.1% | 21.7% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 23.7 | 3.8% | 32.9% |
| 65～ | 19,541 | 73.3 | 23.8 | 3.0% | 34.0% |

| BMI (体重/身長 ²) (男性) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18未満 | 25以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 1,891 | 28.0 | 23.5 | 5.8% | 29.2% |
| 40～64 | 5,470 | 55.5 | 24.5 | 1.4% | 40.6% |
| 65～ | 8,862 | 73.3 | 24.0 | 2.0% | 36.3% |

| BMI (体重/身長 ²) (女性) | | | | | |
|--------------------------------|---------|------|------|-------|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 18未満 | 25以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 22.0 | 10.9% | 17.6% |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 23.3 | 5.2% | 28.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 23.6 | 3.7% | 32.2% |

腹囲




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 1,387 | 29.0 | 76.5 |
| 40～64 | 14,716 | 55.0 | 84.0 |
| 65～ | 12,815 | 69.5 | 85.1 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 85cm以上 |
|-------|---------|------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 497 | 28.6 | 80.3 | 30.8% |
| 40～64 | 5,467 | 55.5 | 86.7 | 55.8% |
| 65～ | 5,814 | 69.5 | 86.4 | 57.7% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90cm以上 |
|-------|---------|------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 890 | 29.2 | 74.4 | 7.5% |
| 40～64 | 9,249 | 54.8 | 82.4 | 21.4% |
| 65～ | 7,001 | 69.6 | 84.1 | 25.9% |

収縮期血圧




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
|-------|---------|------|-------|-----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 4,893 | 10.9 | 104.9 | 0.2% |
| 16～39 | 5,346 | 29.2 | 110.9 | 2.1% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 123.6 | 14.2% |
| 65～ | 19,549 | 73.3 | 130.5 | 24.8% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
|-------|---------|------|-------|-----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,550 | 11.0 | 106.3 | 0.3% |
| 16～39 | 1,891 | 28.0 | 116.3 | 3.4% |
| 40～64 | 5,471 | 55.5 | 126.6 | 17.3% |
| 65～ | 8,865 | 73.3 | 131.1 | 26.5% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 140mmHg以上 |
|-------|---------|------|-------|-----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,343 | 10.9 | 103.4 | 0.1% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 107.9 | 1.4% |
| 40～64 | 9,251 | 54.8 | 121.8 | 12.3% |
| 65～ | 10,684 | 73.2 | 129.9 | 23.4% |

拡張期血圧




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
|-------|---------|------|------|----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 4,893 | 10.9 | 60.9 | 0.3% |
| 16～39 | 5,346 | 29.2 | 67.1 | 2.7% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 75.9 | 10.9% |
| 65～ | 19,549 | 73.3 | 74.9 | 7.3% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
|-------|---------|------|------|----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,550 | 11.0 | 61.2 | 0.4% |
| 16～39 | 1,891 | 28.0 | 69.8 | 4.1% |
| 40～64 | 5,471 | 55.5 | 78.9 | 15.9% |
| 65～ | 8,865 | 73.3 | 75.8 | 8.7% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 90mmHg以上 |
|-------|---------|------|------|----------|
| 0～6 | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,343 | 10.9 | 60.6 | 0.3% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 65.6 | 2.0% |
| 40～64 | 9,251 | 54.8 | 74.1 | 8.0% |
| 65～ | 10,684 | 73.2 | 74.1 | 6.2% |

尿糖




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
|-------|---------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 5,308 | 29.2 | 0.5% |
| 40～64 | 14,686 | 55.1 | 2.2% |
| 65～ | 19,485 | 73.2 | 2.2% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
|-------|---------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 1,889 | 28.0 | 0.6% |
| 40～64 | 5,463 | 55.5 | 3.7% |
| 65～ | 8,841 | 73.3 | 3.6% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
|-------|---------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 3,419 | 29.8 | 0.4% |
| 40～64 | 9,223 | 54.8 | 1.3% |
| 65～ | 10,644 | 73.2 | 1.1% |

尿蛋白




平成27年度

| 尿蛋白 (全体) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 5,308 | 29.2 | 2.6% |
| 40~64 | 14,686 | 55.1 | 1.7% |
| 65~ | 19,485 | 73.2 | 2.8% |

| 尿蛋白 (男性) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 1,889 | 28.0 | 3.3% |
| 40~64 | 5,463 | 55.5 | 2.7% |
| 65~ | 8,841 | 73.3 | 4.2% |

| 尿蛋白 (女性) | | | |
|----------|---------|------|--------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
| 0~6 | . | . | . |
| 7~15 | . | . | . |
| 16~39 | 3,419 | 29.8 | 2.1% |
| 40~64 | 9,223 | 54.8 | 1.1% |
| 65~ | 10,644 | 73.2 | 1.6% |

尿潜血




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 | (1+)以上で生理中を除く |
|-------|---------|------|--------|---------------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 5,307 | 29.2 | 7.6% | 3.1% |
| 40～64 | 14,685 | 55.1 | 6.0% | 4.8% |
| 65～ | 19,485 | 73.2 | 5.7% | 5.7% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 |
|-------|---------|------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 1,889 | 28.0 | 0.9% |
| 40～64 | 5,463 | 55.5 | 2.6% |
| 65～ | 8,841 | 73.3 | 3.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | (1+)以上 | (1+)以上で生理中を除く |
|-------|---------|------|--------|---------------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 16～39 | 3,418 | 29.8 | 11.3% | 4.3% |
| 40～64 | 9,222 | 54.8 | 8.1% | 6.0% |
| 65～ | 10,644 | 73.2 | 7.2% | 7.2% |

血清クレアチニン




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0～6 | . | . | . |
| 7～15 | 4,783 | 11.0 | 0.48 |
| 16～39 | 5,344 | 29.2 | 0.69 |
| 40～64 | 14,721 | 55.0 | 0.74 |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 0.80 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 1.15mg/dL以上 | 1.35mg/dL以上 |
|-------|---------|------|------|-------------|-------------|
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,497 | 11.0 | 0.50 | - | - |
| 16～39 | 1,889 | 28.0 | 0.83 | 0.4% | 0.1% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 0.87 | 3.2% | 0.8% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 0.92 | 9.0% | 3.2% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 0.95mg/dL以上 | 1.15mg/dL以上 |
|-------|---------|------|------|-------------|-------------|
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 0.45 | - | - |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 0.62 | 0.1% | - |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 0.66 | 1.0% | 0.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 0.70 | 5.1% | 1.6% |

eGFR




平成27年度

| eGFR (mL/min. /1.73m ²) (全体) | | | | | |
|--|---------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 50 mL/min. /1.73m ² 未満 | 60 mL/min. /1.73m ² 未満 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 5,344 | 29.2 | 94.4 | 0.0% | 0.3% |
| 40～64 | 14,721 | 55.0 | 75.0 | 1.8% | 10.9% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 65.2 | 11.3% | 34.4% |

| eGFR (mL/min. /1.73m ²) (男性) | | | | | |
|--|---------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 50 mL/min. /1.73m ² 未満 | 60 mL/min. /1.73m ² 未満 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 1,889 | 28.0 | 93.7 | 0.1% | 0.3% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 75.2 | 2.1% | 10.8% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 65.9 | 10.8% | 32.3% |

| eGFR (mL/min. /1.73m ²) (女性) | | | | | |
|--|---------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 50 mL/min. /1.73m ² 未満 | 60 mL/min. /1.73m ² 未満 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | . | . | . | . | . |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 94.8 | - | 0.4% |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 74.8 | 1.6% | 10.9% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 64.6 | 11.6% | 36.2% |

空腹時血糖




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 3,362 | 11.1 | 87.0 | 0.4% | 0.0% | - |
| 16~39 | 4,683 | 29.1 | 88.3 | 1.7% | 0.6% | 0.3% |
| 40~64 | 13,234 | 55.0 | 98.9 | 14.5% | 4.9% | 1.6% |
| 65~ | 16,842 | 73.0 | 104.0 | 24.6% | 8.0% | 1.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,774 | 11.1 | 87.9 | 0.6% | 0.1% | - |
| 16~39 | 1,630 | 27.8 | 90.1 | 2.6% | 0.8% | 0.3% |
| 40~64 | 4,862 | 55.4 | 103.4 | 21.8% | 8.2% | 2.6% |
| 65~ | 7,604 | 73.0 | 107.0 | 30.8% | 10.5% | 2.6% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 110 mg/dL以上 | 130 mg/dL以上 | 160 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 1,588 | 11.1 | 86.0 | 0.1% | - | - |
| 16~39 | 3,053 | 29.7 | 87.4 | 1.3% | 0.5% | 0.3% |
| 40~64 | 8,372 | 54.7 | 96.2 | 10.2% | 3.1% | 1.0% |
| 65~ | 9,238 | 73.0 | 101.5 | 19.5% | 5.9% | 1.3% |

HbA1c (NGSP値)




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
|-------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 4,781 | 11.0 | 5.3 | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 16～39 | 5,345 | 29.2 | 5.3 | 2.5% | 0.6% | 0.2% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 5.6 | 15.0% | 3.3% | 1.3% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 5.8 | 24.8% | 4.5% | 1.2% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
|-------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,495 | 11.0 | 5.3 | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 5.3 | 3.3% | 0.6% | 0.2% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 5.7 | 17.9% | 4.9% | 1.9% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 5.8 | 27.5% | 5.7% | 1.4% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 6.0%以上 | 7.0%以上 | 8.0%以上 |
|-------|---------|------|-----|--------|--------|--------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 5.3 | 0.5% | 0.1% | - |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 5.3 | 2.1% | 0.6% | 0.3% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 5.6 | 13.2% | 2.4% | 1.0% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 5.7 | 22.5% | 3.5% | 1.0% |

HDL-C




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
|-------|---------|------|------|------------|
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 4,783 | 11.0 | 60.7 | 2.7% |
| 16~39 | 5,345 | 29.2 | 62.5 | 4.3% |
| 40~64 | 14,722 | 55.0 | 62.3 | 5.0% |
| 65~ | 19,542 | 73.3 | 59.1 | 7.0% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
|-------|---------|------|------|------------|
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,497 | 11.0 | 61.0 | 2.9% |
| 16~39 | 1,890 | 28.0 | 55.9 | 8.3% |
| 40~64 | 5,469 | 55.5 | 56.3 | 9.8% |
| 65~ | 8,863 | 73.3 | 55.7 | 11.0% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 40 mg/dL未満 |
|-------|---------|------|------|------------|
| 0~6 | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,286 | 10.9 | 60.3 | 2.4% |
| 16~39 | 3,455 | 29.8 | 66.2 | 2.1% |
| 40~64 | 9,253 | 54.8 | 65.8 | 2.2% |
| 65~ | 10,679 | 73.2 | 61.8 | 3.7% |

中性脂肪 (TG)




平成27年度

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (全体) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 4,783 | 11.0 | 78.9 | 7.7% | 0.6% |
| 16～39 | 5,345 | 29.2 | 86.9 | 11.0% | 1.5% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 115.8 | 20.9% | 3.1% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 112.5 | 18.3% | 1.7% |

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (男性) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,497 | 11.0 | 77.0 | 7.6% | 0.6% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 108.8 | 18.3% | 3.1% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 139.9 | 31.0% | 6.2% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 117.1 | 20.7% | 2.4% |

| 中性脂肪 (TG) (mg/dL) (女性) | | | | | |
|------------------------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 150 mg/dL以上 | 300 mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 81.1 | 7.7% | 0.7% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 75.0 | 7.0% | 0.6% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 101.5 | 15.0% | 1.3% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 108.7 | 16.3% | 1.2% |

LDL-C




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 4,782 | 11.0 | 92.5 | 11.7% | 2.8% |
| 16~39 | 5,345 | 29.2 | 109.7 | 33.1% | 15.8% |
| 40~64 | 14,722 | 55.0 | 127.4 | 57.8% | 33.0% |
| 65~ | 19,542 | 73.3 | 119.4 | 47.6% | 24.1% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,496 | 11.0 | 91.0 | 11.3% | 2.8% |
| 16~39 | 1,890 | 28.0 | 114.2 | 39.7% | 21.3% |
| 40~64 | 5,469 | 55.5 | 125.5 | 55.5% | 31.4% |
| 65~ | 8,863 | 73.3 | 115.2 | 42.8% | 20.1% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 120 mg/dL以上 | 140 mg/dL以上 |
|-------|---------|------|-------|-------------|-------------|
| 0~6 | . | . | . | . | . |
| 7~15 | 2,286 | 10.9 | 94.1 | 12.0% | 2.8% |
| 16~39 | 3,455 | 29.8 | 107.3 | 29.4% | 12.9% |
| 40~64 | 9,253 | 54.8 | 128.6 | 59.1% | 33.9% |
| 65~ | 10,679 | 73.2 | 122.9 | 51.6% | 27.5% |

AST




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 4,783 | 11.0 | 24.1 | 11.2% | 0.8% |
| 16～39 | 5,345 | 29.2 | 20.7 | 8.8% | 1.9% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 24.1 | 13.4% | 2.9% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 25.6 | 16.8% | 2.5% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,497 | 11.0 | 25.3 | 15.0% | 1.0% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 24.4 | 17.3% | 3.3% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 26.9 | 20.7% | 4.5% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 26.8 | 21.5% | 3.2% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 22.7 | 7.2% | 0.7% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 18.7 | 4.2% | 1.1% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 22.5 | 9.2% | 1.9% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 24.6 | 12.8% | 1.9% |

ALT




平成27年度

| ALT (U/L) (全体) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 4,783 | 11.0 | 16.1 | 5.0% | 1.8% |
| 16～39 | 5,345 | 29.2 | 21.7 | 15.9% | 7.0% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 24.1 | 19.7% | 6.1% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 21.1 | 13.1% | 3.2% |

| ALT (U/L) (男性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,497 | 11.0 | 18.0 | 7.2% | 2.5% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 31.8 | 32.6% | 14.8% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 30.1 | 32.1% | 10.8% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 23.3 | 17.5% | 4.5% |

| ALT (U/L) (女性) | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 31 U/L以上 | 51 U/L以上 |
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 14.0 | 2.6% | 0.9% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 16.2 | 6.8% | 2.7% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 20.6 | 12.4% | 3.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 19.4 | 9.5% | 2.2% |

γ-GT




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|-----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 4,782 | 11.0 | 14.4 | 0.4% | 0.0% |
| 16～39 | 5,345 | 29.2 | 25.5 | 8.7% | 2.2% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 39.5 | 19.3% | 6.1% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 33.5 | 13.9% | 3.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|-----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,496 | 11.0 | 15.7 | 0.6% | 0.0% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 38.4 | 18.6% | 5.4% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 59.9 | 34.6% | 12.0% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 44.5 | 23.0% | 7.0% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 51 U/L以上 | 101 U/L以上 |
|-------|---------|------|------|----------|-----------|
| 0～6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 13.1 | 0.2% | 0.0% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 18.4 | 3.2% | 0.4% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 27.4 | 10.2% | 2.6% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 24.3 | 6.4% | 1.4% |

尿酸




平成27年度

| 尿酸 (mg/dL) (全体) | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 7.1mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 4,783 | 11.0 | 4.6 | 3.3% | 1.0% |
| 16～39 | 5,344 | 29.2 | 5.0 | 8.2% | 3.0% |
| 40～64 | 14,721 | 55.0 | 5.1 | 8.9% | 2.7% |
| 65～ | 19,542 | 73.3 | 5.2 | 9.1% | 2.7% |

| 尿酸 (mg/dL) (男性) | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 7.1mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,497 | 11.0 | 4.9 | 6.0% | 1.8% |
| 16～39 | 1,889 | 28.0 | 6.1 | 20.9% | 7.9% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 6.1 | 20.9% | 6.7% |
| 65～ | 8,863 | 73.3 | 5.8 | 16.4% | 4.9% |

| 尿酸 (mg/dL) (女性) | | | | | |
|-----------------|---------|------|-----|------------|------------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 7.1mg/dL以上 | 8.0mg/dL以上 |
| 0～6 | . | . | . | . | . |
| 7～15 | 2,286 | 10.9 | 4.3 | 0.3% | 0.0% |
| 16～39 | 3,455 | 29.8 | 4.3 | 1.3% | 0.3% |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 4.5 | 1.8% | 0.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 4.7 | 3.1% | 0.8% |

赤血球数




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0～6 | 2,633 | 3.8 | 4.71 |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 4.82 |
| 16～39 | 5,343 | 29.2 | 4.75 |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 4.64 |
| 65～ | 19,541 | 73.3 | 4.49 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 3.69×10 ⁶ /μL以下 | 3.99×10 ⁶ /μL以下 | 5.80×10 ⁶ /μL以上 |
|-------|---------|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 4.74 | - | 0.4% | 0.3% |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 4.92 | - | 0.2% | 1.1% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 5.19 | 0.1% | 0.2% | 4.4% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 4.92 | 0.6% | 1.9% | 2.5% |
| 65～ | 8,862 | 73.3 | 4.66 | 2.8% | 8.0% | 0.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 3.39×10 ⁶ /μL以下 | 3.69×10 ⁶ /μL以下 | 5.50×10 ⁶ /μL以上 |
|-------|---------|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0～6 | 1,334 | 3.9 | 4.69 | - | 0.1% | 1.3% |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 4.71 | 0.0% | 0.1% | 0.6% |
| 16～39 | 3,453 | 29.8 | 4.51 | 0.2% | 1.1% | 0.5% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 4.48 | 0.2% | 1.5% | 0.4% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 4.34 | 1.3% | 5.5% | 0.2% |

ヘモグロビン



平成27年度


| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0～6 | 2,633 | 3.8 | 12.5 |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 13.5 |
| 16～39 | 5,343 | 29.2 | 14.0 |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 14.0 |
| 65～ | 19,541 | 73.3 | 13.9 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 12.0g/dL以下 | 13.0g/dL以下 | 18.0g/dL以上 |
|-------|---------|------|------|------------|------------|------------|
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 12.5 | 28.6% | 75.2% | - |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 13.8 | 2.8% | 25.0% | 0.1% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 15.6 | 0.5% | 1.2% | 1.1% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 15.3 | 0.7% | 3.1% | 1.2% |
| 65～ | 8,862 | 73.3 | 14.6 | 4.2% | 12.1% | 0.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 11.0g/dL以下 | 12.0g/dL以下 | 16.0g/dL以上 |
|-------|---------|------|------|------------|------------|------------|
| 0～6 | 1,334 | 3.9 | 12.5 | 3.4% | 24.3% | - |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 13.3 | 1.2% | 6.5% | 0.1% |
| 16～39 | 3,453 | 29.8 | 13.1 | 5.9% | 15.8% | 0.3% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 13.3 | 4.6% | 11.4% | 0.6% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 13.2 | 3.1% | 13.5% | 0.7% |

ヘマトクリット

H23～H27年度 ヘマトクリット(%) (全体)



平成27年度

ヘマトクリット (%) (全体)

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 |
|-------|---------|------|------|
| 0~6 | 2,633 | 3.8 | 37.3 |
| 7~15 | 4,886 | 10.9 | 40.4 |
| 16~39 | 5,343 | 29.2 | 42.3 |
| 40~64 | 14,722 | 55.0 | 42.4 |
| 65~ | 19,541 | 73.3 | 41.9 |


ヘマトクリット (%) (男性)

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 35.9%以下 | 37.9%以下 | 55.0%以上 |
|-------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| 0~6 | 1,299 | 3.8 | 37.2 | 31.0% | 63.7% | - |
| 7~15 | 2,548 | 11.0 | 40.9 | 3.5% | 16.8% | - |
| 16~39 | 1,890 | 28.0 | 46.5 | 0.2% | 0.7% | 0.1% |
| 40~64 | 5,469 | 55.5 | 45.5 | 0.5% | 1.4% | 0.4% |
| 65~ | 8,862 | 73.3 | 43.9 | 3.2% | 6.8% | 0.3% |

ヘマトクリット (%) (女性)

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 28.9%以下 | 32.9%以下 | 48.0%以上 |
|-------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| 0~6 | 1,334 | 3.9 | 37.5 | 0.1% | 2.5% | - |
| 7~15 | 2,338 | 10.9 | 39.9 | 0.1% | 0.8% | 0.0% |
| 16~39 | 3,453 | 29.8 | 40.0 | 0.3% | 2.6% | 0.3% |
| 40~64 | 9,253 | 54.8 | 40.6 | 0.4% | 2.1% | 0.7% |
| 65~ | 10,679 | 73.2 | 40.3 | 0.3% | 1.9% | 0.9% |

血小板数




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0～6 | 2,630 | 3.8 | 335.6 | 0.1% | 0.1% | 28.3% | 8.2% |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 283.2 | 0.0% | 0.1% | 7.5% | 0.8% |
| 16～39 | 5,343 | 29.2 | 264.6 | 0.1% | 0.3% | 5.0% | 0.7% |
| 40～64 | 14,719 | 55.0 | 255.6 | 0.2% | 0.6% | 4.1% | 0.6% |
| 65～ | 19,535 | 73.3 | 230.8 | 0.3% | 1.8% | 1.6% | 0.3% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0～6 | 1,296 | 3.8 | 334.5 | - | - | 27.9% | 8.5% |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 283.6 | 0.0% | 0.1% | 8.2% | 0.9% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 255.0 | - | 0.5% | 2.6% | 0.3% |
| 40～64 | 5,468 | 55.5 | 248.8 | 0.2% | 0.6% | 2.9% | 0.4% |
| 65～ | 8,857 | 73.3 | 223.2 | 0.4% | 2.3% | 1.4% | 0.3% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 89×10 ³ /μL以下 | 129×10 ³ /μL以下 | 370×10 ³ /μL以上 | 450×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0～6 | 1,334 | 3.9 | 336.7 | 0.1% | 0.2% | 28.6% | 7.9% |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 282.8 | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 0.6% |
| 16～39 | 3,453 | 29.8 | 269.8 | 0.1% | 0.2% | 6.3% | 0.9% |
| 40～64 | 9,251 | 54.8 | 259.6 | 0.2% | 0.5% | 4.7% | 0.8% |
| 65～ | 10,678 | 73.2 | 237.2 | 0.2% | 1.3% | 1.7% | 0.4% |

白血球数




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0～6 | 2,633 | 3.8 | 8.6 | - | 0.2% | 28.0% | 13.9% |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 6.5 | 0.1% | 2.8% | 5.3% | 1.7% |
| 16～39 | 5,343 | 29.2 | 6.0 | 0.8% | 7.6% | 3.8% | 1.0% |
| 40～64 | 14,722 | 55.0 | 5.8 | 0.8% | 9.0% | 2.9% | 0.9% |
| 65～ | 19,541 | 73.3 | 5.8 | 0.6% | 7.5% | 2.1% | 0.7% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 8.5 | - | 0.2% | 27.9% | 13.9% |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 6.5 | 0.1% | 2.9% | 5.7% | 1.4% |
| 16～39 | 1,890 | 28.0 | 6.1 | 0.3% | 5.8% | 4.6% | 1.2% |
| 40～64 | 5,469 | 55.5 | 6.3 | 0.3% | 4.8% | 4.6% | 1.4% |
| 65～ | 8,862 | 73.3 | 6.1 | 0.4% | 5.6% | 2.8% | 0.9% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 2.9×10 ³ /μL以下 | 3.9×10 ³ /μL以下 | 9.6×10 ³ /μL以上 | 11.1×10 ³ /μL以上 |
|-------|---------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0～6 | 1,334 | 3.9 | 8.6 | - | 0.2% | 28.0% | 13.9% |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 6.6 | 0.1% | 2.7% | 5.0% | 2.0% |
| 16～39 | 3,453 | 29.8 | 5.9 | 1.0% | 8.5% | 3.4% | 1.0% |
| 40～64 | 9,253 | 54.8 | 5.6 | 1.1% | 11.4% | 1.9% | 0.6% |
| 65～ | 10,679 | 73.2 | 5.6 | 0.8% | 9.1% | 1.6% | 0.5% |

白血球分画（好中球数）




平成27年度

| 好中球 (個/μL) (全体) | | | | | | |
|-----------------|---------|------|-------|-----|--------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
| 0~6 | 2,632 | 3.8 | 3,480 | 615 | 14,896 | - |
| 7~15 | 4,886 | 10.9 | 3,253 | 669 | 21,567 | - |
| 16~39 | 5,339 | 29.2 | 3,451 | 546 | 19,952 | - |
| 40~64 | 14,720 | 55.0 | 3,279 | 639 | 14,847 | - |
| 65~ | 19,539 | 73.3 | 3,294 | 267 | 26,386 | 0.0% |

| 好中球 (個/μL) (男性) | | | | | | |
|-----------------|---------|------|-------|-------|--------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
| 0~6 | 1,299 | 3.8 | 3,453 | 615 | 14,896 | - |
| 7~15 | 2,548 | 11.0 | 3,158 | 847 | 10,716 | - |
| 16~39 | 1,888 | 28.0 | 3,427 | 1,024 | 16,994 | - |
| 40~64 | 5,468 | 55.5 | 3,544 | 936 | 14,847 | - |
| 65~ | 8,861 | 73.3 | 3,453 | 267 | 23,537 | 0.0% |

| 好中球 (個/μL) (女性) | | | | | | |
|-----------------|---------|------|-------|-----|--------|----------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
| 0~6 | 1,333 | 3.9 | 3,507 | 668 | 11,949 | - |
| 7~15 | 2,338 | 10.9 | 3,357 | 669 | 21,567 | - |
| 16~39 | 3,451 | 29.8 | 3,464 | 546 | 19,952 | - |
| 40~64 | 9,252 | 54.8 | 3,122 | 639 | 11,780 | - |
| 65~ | 10,678 | 73.2 | 3,162 | 526 | 26,386 | - |

白血球分画（リンパ球数）




平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
|-------|---------|------|-------|-----|--------|----------|
| 0~6 | 2,632 | 3.8 | 4,283 | 930 | 17,327 | - |
| 7~15 | 4,886 | 10.9 | 2,617 | 525 | 7,490 | - |
| 16~39 | 5,339 | 29.2 | 2,005 | 303 | 6,039 | 0.1% |
| 40~64 | 14,720 | 55.0 | 2,026 | 308 | 6,760 | 0.0% |
| 65~ | 19,539 | 73.3 | 2,006 | 380 | 12,977 | 0.0% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
|-------|---------|------|-------|-------|--------|----------|
| 0~6 | 1,299 | 3.8 | 4,264 | 1,001 | 16,555 | - |
| 7~15 | 2,548 | 11.0 | 2,609 | 525 | 7,128 | - |
| 16~39 | 1,888 | 28.0 | 2,094 | 303 | 6,039 | 0.2% |
| 40~64 | 5,468 | 55.5 | 2,132 | 308 | 6,124 | 0.0% |
| 65~ | 8,861 | 73.3 | 2,008 | 380 | 12,977 | 0.1% |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 500/μL以下 |
|-------|---------|------|-------|-----|--------|----------|
| 0~6 | 1,333 | 3.9 | 4,302 | 930 | 17,327 | - |
| 7~15 | 2,338 | 10.9 | 2,625 | 855 | 7,490 | - |
| 16~39 | 3,451 | 29.8 | 1,957 | 533 | 5,184 | - |
| 40~64 | 9,252 | 54.8 | 1,963 | 374 | 6,760 | 0.0% |
| 65~ | 10,678 | 73.2 | 2,005 | 405 | 12,745 | 0.0% |

白血球分画（单球数）




平成27年度

| 单球 (個/μL) (全体) | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 2,632 | 3.8 | 446 | 63 | 1,639 |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 352 | 0 | 1,501 |
| 16～39 | 5,339 | 29.2 | 330 | 45 | 1,711 |
| 40～64 | 14,720 | 55.0 | 317 | 35 | 1,127 |
| 65～ | 19,539 | 73.3 | 336 | 31 | 1,579 |

| 单球 (個/μL) (男性) | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 454 | 69 | 1,638 |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 362 | 45 | 1,270 |
| 16～39 | 1,888 | 28.0 | 359 | 84 | 1,711 |
| 40～64 | 5,468 | 55.5 | 363 | 80 | 1,127 |
| 65～ | 8,861 | 73.3 | 370 | 60 | 1,579 |

| 单球 (個/μL) (女性) | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 1,333 | 3.9 | 437 | 63 | 1,639 |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 342 | 0 | 1,501 |
| 16～39 | 3,451 | 29.8 | 314 | 45 | 1,163 |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 290 | 35 | 1,032 |
| 65～ | 10,678 | 73.2 | 307 | 31 | 1,251 |

白血球分画（好酸球数）




平成27年度

| 好酸球数（個/μL）（全体） | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 2,632 | 3.8 | 293 | 0 | 2,860 |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 269 | 0 | 2,714 |
| 16～39 | 5,339 | 29.2 | 178 | 0 | 2,337 |
| 40～64 | 14,720 | 55.0 | 161 | 0 | 1,787 |
| 65～ | 19,539 | 73.3 | 155 | 0 | 5,340 |

| 好酸球数（個/μL）（男性） | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 314 | 0 | 2,860 |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 307 | 0 | 2,714 |
| 16～39 | 1,888 | 28.0 | 210 | 0 | 2,337 |
| 40～64 | 5,468 | 55.5 | 192 | 0 | 1,787 |
| 65～ | 8,861 | 73.3 | 182 | 0 | 5,340 |

| 好酸球数（個/μL）（女性） | | | | | |
|----------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
| 0～6 | 1,333 | 3.9 | 273 | 0 | 2,674 |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 228 | 0 | 2,499 |
| 16～39 | 3,451 | 29.8 | 160 | 0 | 1,794 |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 143 | 0 | 1,711 |
| 65～ | 10,678 | 73.2 | 133 | 0 | 1,700 |

白血球分画（好塩基球数）



平成27年度

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|
| 0～6 | 2,632 | 3.8 | 38 | 0 | 416 |
| 7～15 | 4,886 | 10.9 | 34 | 0 | 390 |
| 16～39 | 5,339 | 29.2 | 39 | 0 | 204 |
| 40～64 | 14,720 | 55.0 | 42 | 0 | 260 |
| 65～ | 19,539 | 73.3 | 41 | 0 | 711 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|
| 0～6 | 1,299 | 3.8 | 40 | 0 | 416 |
| 7～15 | 2,548 | 11.0 | 36 | 0 | 390 |
| 16～39 | 1,888 | 28.0 | 41 | 0 | 204 |
| 40～64 | 5,468 | 55.5 | 46 | 0 | 202 |
| 65～ | 8,861 | 73.3 | 43 | 0 | 711 |

| 年齢区分 | 受診者数(人) | 平均年齢 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|
| 0～6 | 1,333 | 3.9 | 36 | 0 | 303 |
| 7～15 | 2,338 | 10.9 | 32 | 0 | 388 |
| 16～39 | 3,451 | 29.8 | 38 | 0 | 177 |
| 40～64 | 9,252 | 54.8 | 40 | 0 | 260 |
| 65～ | 10,678 | 73.2 | 39 | 0 | 618 |