




図1 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(伊達市保原町:イチゴ)




図5 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(会津若松市北会津:イチゴ)




図2 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(二本松市:ピーマン)

※2026年度から調査開始




図6 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(会津坂下町:アスパラガス)

※2026年6月2半旬から調査開始

※多発年は会津若松市北会津のデータ




図3 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(須賀川市雨田:キュウリ)

※平年のうち2015年は須賀川市大森田、
2016～2017は須賀川市狸森




図7 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(相馬市南飯沼:イチゴ)

※平年のうち2015～2019年は相馬市和田




図4 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(棚倉町:イチゴ)




図8 フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
(いわき市平菅波:イチゴ)

※平年のうち2015～2017年はいわき市下大越

注:多発年の推移は過去10年で注意報を発表した年次のデータを示した