


図1　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（伊達市保原町：イチゴ）




図5　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（会津若松市北会津：イチゴ）



図2　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（二本松市：ピーマン）
※2026年度から調査開始




図6　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（会津坂下町：アスパラガス）
※2026年6月2半旬から調査開始
※多発年は会津若松市北会津のデータ
※9月5半旬、10月2、3、6半旬は欠測




図3　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（須賀川市雨田：キュウリ）
※平年のうち2015年は須賀川市大森田、
2016～2017は須賀川市狸森




図7　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（相馬市南飯渕：イチゴ）
※平年のうち2015～2019年は相馬市和田




図4　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（棚倉町：イチゴ）




図8　フェロモントラップによるハスモンヨトウ誘殺状況
（いわき市平菅波：イチゴ）
※平年のうち2015～2017年はいわき市下大越

注：多発年の推移は過去10年で注意報を発表した年次のデータを示した