

令和8年度 適期刈取りについて

令和 8 年 8 月 2 6 日
県北農林事務所農業振興普及部

○刈取適期は、出穂後積算気温による刈取適期に達し、籾黄化率が 80～90%程度になった時期です。ただし、出穂後積算気温が 1,200℃に達する前に刈り取りましょう。

1 出穂後積算気温による刈取適期

出穂後積算気温とは、出穂期の翌日以降の日平均気温を合計した気温です。

出穂後積算気温による刈取適期の早限は品種によって異なります（表1）。

出穂後積算気温が 1,200℃を超えると胴割粒の発生が多くなり、落等や食味低下の要因となります。

表1 出穂後積算気温による品種ごとの刈取適期の早限

ひとめぼれ 夢の香、福乃香	天のつぶ 五百万石	コシヒカリ	福笑い
950℃	1,000℃	1,000～1,050℃	1,050℃

表2 刈取適期の予測（8月26日現在）

	出穂期	各出穂後積算気温の到達予想日		
		950℃到達日	1000℃到達日	1200℃到達日
福島市	7月25日	9月1日	9月3日	9月12日
	8月1日	9月8日	9月11日	9月20日
	8月5日	9月12日	9月15日	9月24日
	8月10日	9月19日	9月21日	10月2日
	8月15日	9月25日	9月27日	10月8日
	8月20日	10月2日	10月4日	10月16日
二本松市	7月25日	9月3日	9月5日	9月14日
	8月1日	9月10日	9月13日	9月23日
	8月5日	9月15日	9月17日	9月28日
	8月10日	9月21日	9月24日	10月5日
	8月15日	9月27日	9月30日	10月13日
	8月20日	10月5日	10月8日	10月21日

※出穂後積算気温は令和8年8月2日までは本年実測値の日平均気温、それ以降は平年値を使用して算出しています。

※福島市はアメダス福島（福島市松木町（北緯：37度45.5分、東経：140度28.2分、標高：67m）、二本松市はアメダス二本松（二本松市金色久保（北緯：37度35.0分、東経：140度25.8分、標高：235m））の観測データに基づき算出しています。実際のほ場における気温とは異なる点にご注意ください。

2 籾の黄化率による刈取適期

- ・平均的な生育の株の穂を観察し、籾の 80～90%程度が黄化している時期がそのほ場の刈取適期です。

本資料は県北農林事務所農業振興普及部HPでも公開しています。

